

RIBATRAN®

comprimé enrobé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

TRYPSINE	4,20 microkats
RIBONUCLEASE PANCRÉATIQUE	0,33 microkats
CHYMOTRYPSINOGENE	93,40 microkats

Excipients : saccharose, stéarate de calcium, silice colloïdale hydratée, acide lactique, amidon de blé, gélatine, talc, gomme arabique, acétophthalate de cellulose, phthalate d'éthyle, rouge cochenille A (E124), jaune orangé S (E110), cire d'abeille blanche.

Pour un comprimé enrobé

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé, boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ENZYMOTHERAPIE à visée antioedémateuse

(M : Système locomoteur)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Traitement d'appoint des œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

– antécédents d'allergie à l'un des constituants du comprimé.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Rouge cochenille A (E124)

Jaune orangé S (E110)

Amidon de blé (gluten)

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE

Voie orale : 1 comprimé, 3 fois par jour.

Le comprimé doit être avalé avec un peu d'eau.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS à type de sensibilisation allergique, nécessitant l'arrêt du traitement.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNELEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Septembre 1997