Rifadin®

ريفادين®

ريفادين هو مضاد حيويّ تركيبيّ قاتل للجراثيم وهو فعّال إذا أُخذ عبر الفم وحقنًا. تمّ اكتشافه في مختبرات لوبوتي للأبحاث Lepetit Research Laboratories. المادة الفاعلة في ريفادين هي الريفامبيسين: 3 - (4 ميثيل-1-بيبيرازينيليميدوميثيل) ريفامبيسين إس في.

إنّ نشاطه القاتل للجراثيم في الزجاج وفي حالات الخمج المخبريّة فعّال ضدّ المتفطّرات بما فيها المتفطّرة السليّة وضدّ الحيّيات الدقيقة الإيجابيّة الغرام والسلبيّة الغرام. وقد أكّدت خبرة سريريّة كبيرة هذا النشاط في حالات الخمج بسبب حيّيات دقيقة قبولة للريفامبيسين.

لا يُظهر الريفامبيسين مقاومة تبادليّة مع مضادات حيويّة أخرى باستثناء مضادات الريفامبيسين وبالتالي هو فعّال كذلك ضدّ الحيّيات الدقيقة المقاومة للفئة الأولى. في خلال مدّة العلاج، يجب الانتباه إلى إمكانيّة ظهور سلالات عصيّة وأحيانًا في غضون فترة قصيرة من الوقت؛ ستعتبَر معدّل الحدوث حسب الأجناس البكتيريّة.

لدى البشر، بعد التناول عبر الفم لكميّة تتراوح بين 150 و1200 ملغ، يتمّ بلوغ ذروة مستويات الدم للريفامبيسين قرابة الساعة الثانية وتبقى على قيم قابلة للتقدير ما بعد الساعتين الثامنة والثانية عشرة. بالتناغي مع توزيع ممتاز في أنسجة الجسم وسوائله.

تحدث الإزالة عبر المرّة والبول بشكل أساسيّ حيث يتمّ بلوغ تركيزات عالية جدًا.

دواعي الاستعمال

حالات الخمج التي تسبّبها الحيّيات الدقيقة القبولة للريفامبيسين وبصورة خاصة المتفطّرة السليّة وغيرها من المتفطّرات. كما يُنصح بصورة عامة للاستعمال الصحيح للمضادات الحيويّة، تحديد قابليّة الحيّيات الدقيقة المرضية أو مقاومتها المحتملة الأصليّة أو المكتسبة، بواسطة فحوصات حساسيّة. في حال لم يتجاوب الخمج في غضون مدّة معقولة من الوقت، يجب تغيير العلاج وفي حال المعاودة، لا يُنصح بإعطاء أدوية الريفامبيسين إلى أن يتمّ إجراء فحوصات بكتريولوجية تمهيديّة.

طريقة الاستعمال ومقدار الجرعة

ريفادين للاستعمال عبر الفم

متوافر في كبسولات (من 150 ملغ و300 ملغ من المضاد الحيويّ)، وفي أقراص (من 450 ملغ و600 ملغ من المضاد الحيوي) وفي شراب (10 مل تحتوي على 200 ملغ من المضاد الحيويّ).

الشراب مستحضر طيّب الطعم يوصف بصورة خاصة للمرضى الذين لديهم صعوبة في ابتلاع الكبسولات أو الأقراص.

مقدار الجرعة

البالغون: بصورة عامة 300 ملغ كلّ 12 ساعة. عند الضرورة، يمكن زيادة الجرعة اليوميّة إلى 1200 ملغ.

الأطفال: تتراوح الجرعة اليوميّة الموصى بها بين 10 و20 ملغ/كلغ من وزن الجسم، مقسومة على كميّتين متساويتين. يوصى بعدم تجاوز الجرعة اليوميّة من 600 ملغ.

تعليمات الاستعمال:

لامتصاص أسرع وأكثر كمالاً يُنصح بأخذ ريفادين والمعدة فارغة بين الوجبات.

لعلاج داء السل يُنصح بإعطاء جرعة فرديّة يوميّة من 600 ملغ (450 ملغ للأشخاص ما دون الـ50 كلغ)، بالتزامن مع أدوية أخرى مضادة للسل. في الحالات المكتشفة مؤخّرًا، العلاج الأكثر فعاليّة هو نظام المعالجة الكيميائيّة المستمرّ القصير الأمد من 9 أشهر مع الجرعات المذكورة أعلاه بالتزامن مع الإيزونيازايد وفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى مع دواء ثالث مضاد للسل.

ريفادين للتسريب بالوريد

متوافر في قارورة (600 ملغ من المضاد الحيوي) مع أنبولة مذيب. يُنصح به بشكل خاص عندما لا يسمح الوضع السريري (جراحة، اضطراب في الامتصاص المعدي المعوي، إلخ.) أو التحمّل المعدي لدى المريض بالإعطاء الفموي للمضاد الحيوي أو عندما لا يُنصح بذلك.

يحضّر المحلول بإضافة أنبولة المذيب إلى قارورة الريفامبيسين وبالرجّ بقوّة بدون توقّف لثلاثين ثانية تقريبًا. وعند الاختفاء الكامل للرغوة، يجب تخفيف هذا المحلول على الفور بـ500 مل من محلول الغلوكوز 5 % ويجب استعمال المحلول المحضّر بهذه الطريقة في غضون ساعات قليلة. يُنصح بضبط سرعة التقطير لكي يستغرق التسريب بالوريد 3 ساعات تقريبًا

مقدار الجرعة

حالات الخمج غير النوعيّة:

للبالغين: تبلغ الجرعة اليوميّة الموصى بها 600 ملغ

السلّ الرئوي:

لدى البالغين تبلغ الجرعة اليوميّة الموصى بها 600 ملغ، تُعطى عادة بمرّة واحدة. يجب دائمًا أن يترافق علاج السل الرئويّ بريفادين للتسريب بالوريد مع أدوية أخرى مضادة للسل.

موانع الاستعمال

لا ينبغي إعطاء ريفادين للمرضى الذين يعانون من فرط حساسيّة ضدّ أدوية الريفامبيسين ومن اليرقان وفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل الموكّد أو المحتمل. أمّا في خلال الأشهر المتبقية من الحمل وفي سنّي الطفولة الأولى، فيجب إعطاء الدواء في حالة الحاجة الضرورية وتحت مراقبة الطبيب المباشرة.

تحذيرات ومحاذير

يمكن أن يرافق إعطاء الريفامبيسين تحريض أجهزة انزيمات أيض الدواء في الكبد. قد يتأثّر أيض هذه المواد التي هي ركائز في هذه الأنظمة وفي بعض الحالات قد يتسارع مع إمكانيّة النسّيب في تخفيف المفعول الدوائي. وقد أفيد عن تغييرات ذات أهميّة سريريّة محتملة في ما يتعلّق بمضادات التخثّر ومضادات السكّري الفمويّة ومستحضرات الديجيتاليس وموانع الحمل الفمويّة. قد يكون من الضروريّ تعديل جرعات هذه الأدوية إذا أعطيت بالتزامن مع ريفادين لا سيّما في بداية العلاج بالمضاد الحيوي هذا ونهايته.

يجب نصح النساء اللواتي يستعملن موانع حمل فمويّة في خلال العلاج بريفادين باستعمال طرق غير هورمونيّة لمنع الحمل بما أنّ المفعول المانع للحمل للمستحضرات الهورمونيّة التي تسبّب الركود المبيضي قد يتأثّر سلبيًا ولكن في حالات نادرة فقط.

يجب إعطاء الدواء لفترات محدّدة من الزمن وبجرعات منخفضة عندما يكون ذلك ممكنًا واعتماد طرق علاجيّة أخرى بالتناوب.

يجب عدم إعطاء ريفادين للمرضى الذين يعانون من مرض في الكبد، بخاصة في حالات الإدمان المزمن على الكحول وتشمّع الكبد إلا عند الضرورة وتحت إشراف طبيّ. في هذه الحالات، يُنصح بإعطاء جرعات منخفضة من المضاد الحيويّ وإيقاء استعمال أيّ دواء آخر وجرعاته في الحدّ الأدنى بخاصة إذا كان هذا الدواء سامًّا للكبد ومراقبة وظيفة الكبد.

لدى هؤلاء المرضى كما لدى المرضى المسنّين الذين يعانون من نقص في التغذية وفي سنوات الطفولة الأولى، يُنصح باعتماد الحذر لا سيّما في حالات الاستعمال المتزامن للإيزونيازايد.

لدى المرضى الذين يخضعون لعلاج طويل الأمد بالريفامبيسين، يُنصح بإجراء مراقبة دوريّة لصورة الدم ووظيفة الكبد. وفي مراقبة وظيفة الكبد، لا ينبغي إجراء فحص البروموسلفثالين بما أنّ للريفامبيسين مفعولا تنافسيًا في ما يتعلّق بإزالة البروموسلفثالين وبالتالي يمكن إعطاء انطباع خاطئ عن تغيّر وظيفة الكبد.

في حالة الاعطاء المتزامن للايزونيازايد، يمكن أن يزداد تواتر التأثيرات الجانبيّة المتعلّقة بالدم وحدّتها

في علاج حالات الخمج غير السليّة، عندما يشك بحالة سلّ متزامنة يجب عدم استعمال الريفامبيسين إلى أن يتمّ التشخيص بوضوح بغية عدم حجب حالة السلّ وعدم التسبّب بنشوء مقاومة للمتفطّرات.

في حال استعمل ريفادين بالتزامن مع أدوية "باس" PAS فمويّة تحتوي على البنتونايت كسواغ، لا ينبغي إعطاء الدوائين معًا ولكن مع فرق من 8 ساعات على الأقلّ.

بسبب طعم الشراب الطيّب، يُنصح بإبقاء الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال.

يمكن أن يسبّب استعمال ريفادين تلوّن البول والدموع والقشع بلون ضارب إلى الأحمر قويّ نسبيًا. لا تدعو هذه الظاهرة إلى القلق.

يحتوي الشراب على ميتابيسولفيت الصوديوم وهي مادة قد تسبّب ارتكاسات تحسسيّة ونوبات ربو حادة لدى بعض الأشخاص القابلين لذلك لا سيّما لدى المرضى المصابين بالربو.

التأثيرات الجانبيّة

أفيد عن أنّ استعمال الريفامبيسين سبّب اضطرابات معديّة معويّة مثل الألم الشرسوفي وقلّة الشهوة للطعام والغثيان والتقيّؤ وانتفاخ البطن والمعص والإسهال. كما أفيد عن صداع ونعاس ووهن ودوار وضعف القدرة على التركيز واضطرابات بصريّة وضعف عضلي وألم في الأطراف واضطرابات في العادة الشهريّة. وأفيد كذلك عن ارتكاسات ثانويّة من فرط الحساسيّة مع طفح جلدي وشرى وحكّة وكثرة حمضات والتهاب الفم واللسان التقرّحي وقلّة الصفيحات الدمويّة وقلّة الكريات البيض في حالات معزولة وفقر دم انحلالي والتهاب الكبد مع يرقان وقصور كلوي وبول دموي وبيلة خضابيّة وتغييرات في البليروبين والفسفاتاز القلويّ ومستويات ناقلات الأمين وفحوصات "بي إس بي" BSP.

التوضيب

8 و50 و100 كبسولة تحتوي على 150 ملغ من الريفامبيسين.

8 و50 و100 كبسولة تحتوي على 300 ملغ من الريفامبيسين.

8 و32 قرصًا يحتوي على 450 ملغ من الريفامبيسين.

8 و32 قرصًا يحتوي على 600 ملغ من الريفامبيسين.

الشراب: قارورة من 60 مل تحتوي على 1.2 غ من الريفامبيسين. (زجاجة قياس مدرّجة على 2.5 و5 و7.5 مل). يجب غسل الزجاجة جيّدًا بعد كل جرعة من الشراب.

قارورة التسريب بالوريد: علبة تحتوي على قارورة واحدة من الريفامبيسين المجفّف بالتجميد (600 ملغ) + أنبولة واحدة من المذيب (10 مل).

يجب غسل الزجاجة جيّدًا بعد كل جرعة من الشراب.

زجاجة قياس مدرّجة على 2.5 و5 و7.5 مل

إحفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال.

Lepetit

GRUPPO LEPETIT S.p.A. Milan, ITALY

ان هذا الدواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.

89022383