Sectral® 200 mg

سكترال® 200 ملغ

أسيبوتولول

أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

إقرأ بدقة هذه النشرة كاملة قبل استعمالك هذا الدواء.

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كان لديك أسئلة أو شكوك، اسأل طبيبك أو الصيدلي للمزيد من المعلومات.
- هذا الدواء وُصف لك شخصياً ولا يجدر بك إعطاؤه للآخرين. فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم شبيهة بعوارضك.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبيّة أو في حال لاحظت أيّ تأثير جانبيّ غير مذكور في هذه النشرة، إعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة وما هي دواعي استعماله
2. قبل أن تأخذ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
3. كيف تأخذ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف تحفظ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة
6. معلومات إضافيّة

1. ما هو سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة وما هي دواعي استعماله

الفئة الدوائيّة العلاجيّة: حاصرة بيتا إنتقائيّة

هذا الدواء هو حاصرة بيتا وهو يخفّض بعض مفاعيل ("مفاعيل البيتا") الجهاز الودّي الذي يتحكّم بوظيفة القلب ودوران الدم.

يُستعمل هذا الدواء في علاج:

- فرط الضغط الشرياني،
- بعض اضطرابات النظم القلبي،
- الوقاية من نوبات الذبحة الجهديّة المؤلمة،
- العلاج الطويل الأمد بعد الاحتشاء العضلي القلبي.

2. قبل أن تأخذ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

إذا قال لك الطبيب إنّك لا تتحمّل بعض أنواع السكّر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول مطلقاً سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، في الحالات التالية:

- أشكال الربو الحادة والانسداد الرئوي المزمن (أشكال الربو الحادة والمرض الشعبي والرئوي مع انسداد)،
- القصور القلبي غير المضبوط بالعلاج (مشاكل وظيفة القلب غير المضبوطة بالعلاج)،
- الصدمة القلبيّة (صدمة تسببها مشاكل في القلب)،
- إحصار أذيني بطيني من الدرجتين الثانية والثالثة لدى المرضى الذين لا يحملون ناظمة (مشاكل توصيل قلبيّة خاصة)،
- خناق مختلف الشكل (في شكله النموذجي وكعلاج بدواء واحد) (نوع من نوبة خَناق)،
- مرض الجيب (بما في ذلك الإحصار الجيبي الأذيني)،
- البطء الكبير في القلب (أقلّ من 50-45 ضربة في الدقيقة) (بطء النظم القلبي)،
- الأشكال الحادة من داء رينو والاضطرابات الشريانيّة المحيطيّة (الأشكال الحادة من الاضطرابات الدورانيّة والخدر في أصابع اليدين والاضطرابات الشريانيّة في الأطراف)،
- ورم القوائم غير المعالج (نموّ في الغدّة اللبيّة الكظريّة التي تفرز مواداً تسبّب ارتفاعاً حاداً في الضغط الشرياني)،
- نقص الضغط (هبوط ضغط الدم)،
- فرط الحساسيّة ضد الاسيبوتولول،
- ماض من التفاعل الاستهدافيّ (ماض من التفاعل الأرجيّ)،
- الارضاع،
- التناول المتزامن مع الفلوكتافينين (دواء مضاد للألم)،
- إذا كنت حسّاساً ضدّ القمح لأنّ الدواء يحتوي على نشا القمح

بصورة عامة يجب عدم استعمال هذا الدواء مع البيبريديل، الدلتيازيم والفيراباميل (أدوية للقلب).

إعتمد عناية خاصة مع سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

تحذيرات خاصة

بسبب وجود اللاكتوز، يجب عدم استعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمّل الغالاكتوز أو من نقص اللاكتاز لاب أو من تنادر سوء امتصاص الغلوكوز-غالاكتوز.

لا توقف أبداً علاجك فجأة بدون استشارة طبيبك.

لا تترك الدواء في متناول الأطفال.

محاذير عند استعمال سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

يجب إعلام الطبيب في حالات الحمل والداء السكّري والقصور الكلويّ أو الكبدي وداء الصدف والحساسيّة وبعض الأمراض الوريديّة (متلازمة رينو).

في حال الخضوع لعمليّة جراحيّة، يجب إعلام طبيب التخدير بتناول هذا الدواء.

يمكنك تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من مرض جوفيّ قد يحتوي نشا القمح على الغلوتن ولكن بكميّة ضئيلة جداً وبالتالي لا يُعتبر خطراً بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من المرض الجوفي.

تناول/استعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً دواء آخر، لا سيّما بيبريديل أو دلتيازيم أو فيراباميل أو دواء حصلت عليه من دون وصفة طبيّة، تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والإرضاع

الحمل

يمكن تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل في حال الضرورة.

في حال أخذ هذا العلاج في نهاية فترة الحمل، من الضروريّ إخضاع الطفل الحديث الولادة للمراقبة الطبيّة لبضعة أيّام لأنّ بعض مفاعيل هذا العلاج يمكن أن تظهر لدى الطفل الحديث الولادة.

الإرضاع

إن إفراز هذا الدواء قويّ في حليب الثدي. لذا فالارضاع ممنوع خلال العلاج.

الرياضيّون

يجب أن يتنبّه الرياضيّون إلى أن هذا الدواء يحتوي على مادة دوائيّة قد تسبّب تفاعلاً إيجابيّاً في الفحوصات المستعملة لكشف تناول المنشّطات.

معلومات مهمّة حول بعض مركّبات سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

لائحة الأسوخة التي لها تأثيرات خاصة: اللاكتوز ونشا القمح (غلوتين).

3. كيف تأخذ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

ما هو عدد أقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة التي يجب تناولها

يجب التقيّد دائماً بمقدار الجرعة التي وصفها الطبيب.

إذا كان لديك أيّ شك، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

يتغيّر مقدار الجرعة حسب الاضطراب الذي يُعالج ويُكيّف وفقاً كلّ مريض.

كيف يجب تناول أقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة

عبر الفم.

يجب إبتلاع الأقراص مع الماء بدون مضغها.

ما هو عدد مرّات تناول أقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة

في الحالات كافة، يجب التقيّد بدقّة بوصفة الطبيب.

ما هي مدّة العلاج بأقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة

في الكثير من الحالات المرضيّة، يدوم العلاج بحاصرة بيتا بضعة أشهر أو سنين. سوف يُعلمك طبيبك بمدّة العلاج.

إذا تناولت أقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة أكثر من التي يجب عليك تناولها

أعلم الطبيب أو المستشفى.

إذا نسيت تناول أقراص سكترال 200 ملغ المغلّفة بطبقة رقيقة

في حال نسيت تناول قرصك، تناوله في أسرع وقت ممكن وأكمل علاجك بطريقة اعتياديّة. لا يجدر بك أبداً تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة التي نسيتها.

إذا كان لديك اسئلة حول استعمال هذا الدواء، أطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو من الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبّب سكترال 200 ملغ أقراص مغلّفة رقيقة، تأثيرات جانبيّة لا تُصيب المرضى كلّهم.

- التأثيرات الأكثر شيوعا هي: التعب، الأطراف الباردة، تباطؤ النبض، الاضطرابات المعديّة المعويّة، العُنّة.
- التأثيرات النادرة: التباطؤ الكبير في نظم القلب، القصور القلبيّ، انخفاض في ضغط الدم، صعوبة في التنفّس، تدنّي سكّر الدم (كميّة غير كافية من السكر في الدم)، متلازمة رينو، تفاقم العرج المتقطّع الموجود أصلا (صعوبة في السير)، إضطرابات جلديّة متعددة بخاصة حالات الطفح مثل داء الصدف أو تفاقم داء الصدف.
- التأثيرات الاستثنائيّة: الاعتلال الرئوي الأرجيّ المناعيّ (مرض في الرئتين)، مشاكل مناعيّة (ظهور مضادات أجسام مضادة للنووي) قد تؤدّي إلى الذأب.

أعلم طبيبك أو الصيدليّ في حال حصول تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة أو في حال تفاقمها.

5. كيف تحفظ سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

أبقِ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.

لا تستعمل سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة بعد انقضاء تاريخ الصلاحيّة المدوّن على العلبة.

إحفظ الدواء على درجة حرارة ما دون 25 درجة مئويّة.

يجب عدم رمي الأدوية في المياه المبتذلة أو في النفايات المنزليّة. إسأل الصيدلي حول كيفيّة التخلّص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. من شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافيّة

ماذا يحتوي سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة

المادة الفاعلة هي:

هيدروكلوريد الأسيبوتولول	221.70 ملغ
الكميّة الموافقة للأسيبوتولول	200.00 ملغ

للقرص الواحد المغلّف بطبقة رقيقة.

المركّبات الأخرى هي:

لاكتوز، نشا القمح، طَلق، سليكا غروانيّة خالية من الماء، بوليفيدون، ستيبارات المغنيزيوم، هيبروميللوز، ماكروغول 20000.

كيف يأتي سكترال 200 ملغ، أقراص مغلّفة بطبقة رقيقة ومحتويات العلبة

يأتي هذا الدواء كأقراص مغلّفة بطبقة رقيقة، علبة من 30 قرصاً.

حامل رخصة التسويق والشركة المشغّلة

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris, France.

المصنّع

Famar Lyon
29 avenue Charles de Gaulle
69230 Saint-Genis-Laval, France.

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة: نيسان 2009.

ان هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحتك و استهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب.