

روليد® 150 ملغ

روكسيثرومايسين

أقراص مغلّفة

اقرأ هذه النشرة بدقة قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.
- إن كان لديك أسئلة أو شكوك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا يجدر بك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم، حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة وما هي دواعي استعماله
2. قبل أن تتناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة
3. طريقة تناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة
4. التأثيرات الجانبية المحتملة
5. طريقة حفظ روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة
6. معلومات إضافية

1. ما هو روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

وما هي دواعي استعماله

يُستعمل هذا الدواء لعلاج بعض حالات الخمج البكتيرية القابلة لهذا الدواء.

2. قبل أن تتناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

إذا أعلمك طبيبك أنك لا تتحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية ضد المضادات الحيوية من فئة الماكروليد.
- بالتزامن مع:
 - الإرغوتامين والديهيدروإرغوتامين (دواءان يُستعملان لعلاج الشقيقة)
 - السيترابريد (دواء يُستعمل لعلاج الارتداد).
- (راجع فقرة تناول/استعمال أدوية أخرى).
- لدى النساء اللواتي يرضعن طفلاً يتلقّى علاجاً بالسيترابريد (راجع فقرة الحمل والارضاع).

يعتمد عناية خاصة مع روليد 150 كلغ، أقراص مغلّفة

تحذيرات خاصة

بما أن هذا الدواء يحتوي على الغلوكوز، لا يجدر بك تناوله إذا كنت مصاباً بتناذر سوء امتصاص الغلوكوز– غلاكتوز. أعلم طبيبك إذا كنت مصاباً بقصور كبدّي. يجب تفادي تناول هذا الدواء بالتزامن مع الكولنشيبيين أو فلوانثيات الإرغوت الدوبامينية الفعّل (بروموكريبتين، كابرغولين، ليزوريد، برغوليد). (راجع فقرة تناول/ استعمال أدوية أخرى).

محاذير الاستعمال

من المهمّ أن تعلم طبيبك إذا كنت تعاني من مرض كبدّي لأنّ علاجك يجب أن يعدّل. أعلمي طبيبك إذا كنت حاملاً أو مرضعة. في حال الشكّ لا تتردّد باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

Rulid® 150 mg

أعلم طبيبك بأيّ تغيير في النشاط القلبي يكشفه مخطط كهربائية القلب أو في حال كنت مصاباً بنقص البوتاسمية (مستويات منخفضة جداً غير طبيعية من بوتاسيوم الدم) أو بنقص المغنيزيوم غير المصحّح (مستويات منخفضة جداً غير طبيعية من مغنيزيوم الدم) أو ببطء القلب (نظم قلب بطيء) أو إذا كنت تتناول دواء لعلاج نظم القلب غير الطبيعي.

أعلم طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي عضلي لأنّ هذا الدواء قد يزيد سوءاً.

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، يجب عليك دائماً أن تعلم الطبيب أو الصيدلي بأيّ علاج آخر قد تكون تتلقّاه.

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظّهم.

تناول/ استعمال أدوية أخرى

لا ينبغي تناول هذا الدواء بالتزامن مع الإرغوتامين والديهيدروإرغوتامين (دواءان يُستعملان لعلاج الشقيقة) أو السيترابريد (دواء يُستعمل لعلاج الارتداد).

(راجع فقرة لا تتناول هذا الدواء في الحالات التالية).

يجب تفادي تناول هذا الدواء بالتزامن مع الكولنشيبيين أو فلوانثيات الإرغوت الدوبامينية الفعّل (بروموكريبتين، كابرغولين، ليزوريد، برغوليد). (راجع فقرة تحذيرات خاصة).

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أيّ أدوية أخرى بما فيها تلك التي حصلت عليها من دون وصفة.

الحمل والارضاع

الحمل

يُفضّل عدم استعمال هذا الدواء في خلال فترة الحمل.

إذا اكتشفت أنك حامل في خلال فترة العلاج، استشيري طبيبك لأنّه الوحيد القادر على تحديد ضرورة متابعة العلاج.

الارضاع

يمكنك الارضاع في خلال فترة العلاج بهذا الدواء. ولكن إذا أصيب طفلك باضطرابات هضمية (داء البويضات، إسهال)، أوقفي الارضاع واستشيري الطبيب على الفور. إذا كان طفلك الرضيع يعالج بالسيترابريد، يمنع استعمال هذا الدواء.

كقاعدة عامة، يجب عليك دائماً استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أيّ دواء في خلال فترتي الحمل والارضاع.

القيادة واستعمال الآلات

قد يجعل خطر الدوار القيادة أو استعمال بعض الآلات خطيراً.

لائحة الأسوغة التي يجب أخذها بعين الاعتبار للاستعمال الآمن لدى بعض المرضى: الغلوكوز

3. طريقة تناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

كيف يجب تناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة في كافة الأحوال، تقيد بدقة بوصفة الطبيب. تقيد بمدة العلاج.

على سبيل الإشارة:

لدى البالغين، يبلغ مقدار الجرعة العادية قرصاً واحداً صباحاً ومساءً ويفضّل أخذه قبل الطعام.

ما هي مدة العلاج بروليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

لكي يكون المضاد الحيويّ هذا فعّالاً، يجب استعماله بانتظام وفقاً للجرعات الموصوفة ولمدّة التي حددها طبيبك.

لا يعني اختفاء الحمى و/أو أيّ عوارض أخرى أنك شُفيت تماماً. إذا شعرت بالتعب، لا يكون ذلك بسبب العلاج بالمضاد الحيويّ بل بسبب الخمج. لن يكون لتخفيض الجرعات أو لإيقاف العلاج أيّ تأثير على هذا الشعور ومن شأن ذلك تأخير شفائك.

حالة خاصة: تبلغ مدّة العلاج لبعض حالات التهاب الحلق 10 أيام.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبّب روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلهم:

- تأثيرات هضمية: غثيان، تقيؤ، ألم في المعدة، إسهال.
- تأثيرات قلبية: اضطرابات في النظم البطيني، توقف القلب.
- تأثيرات عصبية: دوار، صداع، أحاسيس غير طبيعية في رؤوس الأصابع، اضطرابات في حاستي الذوق والشمّ.
- تأثيرات كبدية: زيادة عابرة في بعض انزيمات الكبد (ناقلات الأمين) قد تؤدّي إلى الإصابة بالتهاب الكبد القامع الصفراء (نوع من التهاب غير فيروسيّ في الكبد) أو باليرقان.
- ارتكاسات تحسسية حادة: حُزب وعاني (نوع من الشرى مع تورّم مفاجي في الوجه والعنق)، صعوبة في التنفس.
- طفح جلدي، شرى، ارتكاسات جلدية مع نغطات، فرقرية (بقع صغيرة حمراء أو ضاربة إلى الزرقة على الجلد).
- تأثيرات نفسية: هلوسة.

إذا لاحظت أيّ تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أو إذا أصبح أحد التأثيرات الجانبية خطيراً، الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي.

5. طريقة تناول روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظّهم. لا تستعمل روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العلبة. لا تحفظ هذا الدواء في حرارة تفوق 25 درجة مئوية. لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتدلة أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي ما الذي يجب فعله بالأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة

المادة الفاعلة هي:

روكسيثرومايسين.....150 ملغ
للقراص المغلف الواحد.

المكوّنات الأخرى هي:

هيدروكسيبروبيلسلولوز، بوليوكسيبايثيلين– بوليوكسيبروبيلين غليكول (بلورونيك® إف 68)، بوفيدون، سيليكات غروانية لا مائيّة (أيروسيل® 200)، ستيرات المغنيزيوم، طلق، نشا الذرة، الغلاف: هيدروكسيبروبيلسلولوز الميثيل (6 سي بي إس)، غلوكوز لامائي، ثاني أكسيد التيتانيوم (بي 171)، غليكول البروبيلين.

ما هو روليد 150 ملغ، أقراص مغلّفة ومحتويات العلبة الخارجيّة

أقراص مغلّفة. علبة من 10 أقراص.

قد لا تكون أحجام العلب كلّها مسوّقة.

حامل رخصة التسويق والشركة المشغّلة

sanofi-aventis France
1-13, Boulevard Romain Rolland
75014 Paris
France

الصنّع

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, Route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
France

تاريخ الموافقة الأخيرة على هذه النشرة، شباط 2010.

توصيات/ تثقيف صحيّ

ما الذي يجب عليك معرفته حول المضادات الحيوية إن المضادات الحيوية فعّالة في مقاومة حالات الخمج التي تسببها البكتيريا. وهي ليست فعّالة في مقاومة حالات الخمج التي تسببها الفيروسات. لذلك فقد اختار طبيبك وصف المضاد الحيوي هذا لك لأنّه يناسب حالتك ويناسب المرض الذي تعاني منه. إن البكتيريا قادرة على البقاء أو على التكاثر بالرغم من مفعول المضاد الحيوي. يعرف هذا بالمقاومة ويجعل بعض العلاجات بالمضادات الحيوية غير فعّالة. تزداد هذه المقاومة بسبب إساءة استعمال المضادات الحيوية أو استعمالها بشكل مفرط.

قد تعزّز نمو البكتيريا المقاومة وتبطل بالتالي شفاءك، أو حتّى قد تجعل هذا الدواء غير فعّال في حال لم تتقيّد بما يلي:

- الجرعة الموصوفة.
- أوقات التناول.
- مدّة العلاج.

لذلك، بغية الحفاظ على فعالية هذا الدواء:

1. استعمل فقط مضاداً حيوياً عندما يصفه لك طبيبك.
2. تقيد بدقة بالوصفة.
3. لا تستعمل مجدداً مضاداً حيوياً بدون وصفة طبية حتّى إن كنت تعتقد أنك تستطيع شفاء مرض يبدو ماثلاً.
4. لا تطع أبداً مضادك الحيويّ لأحد آخر فقد لا يلائم مرضه.
5. عند انتهاء علاجك، أعد كلّ العلب المفتوحة للصيدلي كي يتخلص من هذا الدواء بالطريقة المناسبة.

ان هذا الدواء

مستحضر يورثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

اتب بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
والاتحاد الصيدلانة العرب.

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.