

Roxithromycine[®] 100mg

roxithromycine

COMPRIMÉS / ENFANT

COMPOSITION

Roxithromycine.....100 mg
Excipient.....q.s.p. un comprimé

PRESENTATION

Boîte de 10 comprimés sous plaquette thermoformée.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est un antibiotique de la famille des macrolides.

Ce médicament est préconisé dans des infections : O.R.L., broncho-pulmonaires et cutanées.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue aux macrolides.
- Association aux dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine, dihydroergotamine).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament est déconseillé :

- lors d'insuffisance hépatique,
- lors de prise concomitante de dérivés de l'ergot de seigle, notamment ergotamine.

Cette forme comprimé n'est pas adaptée aux enfants de moins de 4 ans.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, douleurs d'estomac, diarrhées.

- Manifestations allergiques.

- Vertiges.

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants ; ne pas

hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

A titre indicatif, chez l'enfant, la posologie usuelle est :

- Enfants de 24 à 40 kg : un comprimé à 100 mg matin et soir.
- Pour les enfants de moins de 24 kg, préférer le comprimé à 50 mg.

Prendre de préférence les comprimés avant les repas. L'utilisation de ces comprimés est déconseillée chez l'enfant de moins de 4 ans.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONDITION DE DELIVRANCE

Ce médicament est inscrit sur la liste I.

Sa délivrance ne peut être renouvelée que si le médecin l'a expressément indiqué sur l'ordonnance ou sur présentation d'une nouvelle ordonnance.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise :

- il peut ne pas être adapté à un autre cas,
- ne pas le réutiliser sans avis médical,
- ne pas le conseiller à une autre personne.

DUREE DE STABILITE

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante (entre 10° et 25°).

LABORATOIRES ROUSSEL

97, rue de Vaugirard - 75279 PARIS CEDEX 06

Tél. : (1) 45.55.91.55

ROUSSEL

R 71 619 0