

Xatral® SR 5 mg

كزاترال® إس آر 5 ملغ

أفوزوسين

أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء.

- يحفظ الدواء النشرة في مكان جاف إلى ارتفاعها محبذا
- لا تترك الدواء في أسئلة الصافي أو في مكانه. استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على المعلومات
- في حال نسيبت تناول الدواء لك أنت شخصيا لا يجوز به إعطائه لأخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضه
- في حال نسيبت تناول الدواء لك أنت شخصيا لا يجوز به إعطائه لأخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضه
- الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي

في هذه النشرة:

- 1 ما هو كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق وما هي دواعي استعماله؟
- 2 قبل أن تتناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق
- 3 كيف تتناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق
- 4 الآثار الجانبية المحتملة
- 5 كيفية حفظ كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق
- 6 معلومات إضافية

1. ما هو كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق، وما هي دواعي استعماله؟

يستخدم هذا الدواء لشفة الأعراض المؤقتة لتضخم البروستات المسببة إحصار الدم

2. قبل أن تتناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

لا تتناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق في

- حساسية معروفة ضد الأفوزوسين، و/أو ضد مركب آخر من مركبات الدواء
- نقص الضغط الوعائي (تضخم الشرايين) بعدد عادة عند الإقلاق من وضع الاستلقاء الأفوق)
- قصور جاذ في وظيفة الكبد (تضخم الكبد)
- قصور جاذ في وظيفة الكلى
- بالتزامن مع الريتينوليد

إعتمد حذرا، خاصة مع كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

التحذيرات الخاصة

في مكانه بعض المرضى ضحايا عوارض عكسية تجاه كزاترال إس آر 5 ملغ. مما يجب لهم هبوطا في ضغط الدم عند الإقلاق من وضع الاستلقاء إلى الأفوق. لا يحدث هذا التحذير في الساعات القليلة الأولى بعد تناول الدواء ويكتف محسوبا بالأعراض الشبيهة. دور تعب متكرر

يجب أن يلقى المريض مستلقيا حتى تخففي الكلال عند العوارض المعروفة

بوصفي معياد، الحظر بخاصة لدى المسنين والمرضى الذين يعانون من هبوط الدم بعد تناول دواء من الفئة نفسها (محاربات ألفا)

تأثير الفعولة الدوية خلال الجراحة

إذا كنت ستخضع لجراحة (تحت ضغط دم ثابت) في المستقبل القريب وإذا عولجت في السابق أو كنت تتعاطى حاديا وكزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

المحاذير عند تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

تتناول أو استعمال أدوية أخرى

الحمل والإرضاع

القيادة واستعمال الآلات

الأدوية ذات الفعول المحددة

3. كيف تتناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

ما هو هذا الدواء

كيفية تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

يجب اتباع الأقراص كاملة مع كوب من الماء

متى يجب تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

عدد مرات تناول

ما هي مدة تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

إذا تناولت كمية من كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق أكثر من التي يجب عليك تناولها

إذا نسيبت تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

4. الآثار الجانبية المحتملة

ملا الأدوية التالية يمكن أن يستبيكر أقراص إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

- تأثيرات جانبية
- التأثيرات الشائعة
- دوخة، دوران بواب، إغماء، هبوط في ضغط الدم عند الإقلاق من وضع الاستلقاء إلى الأفوق، صاع
- اضطرابين معدية معوية مثل الغثاق، ألم المعدة أو إسهال، جفاف الفم
- شعور بالتعب
- التأثيرات غير الشائعة
- شعور
- نسيان
- اضطرابات في التنفس
- تسارع سرعة القلب، خفقان، خفقان
- احتقان الأنف
- ارتكاسات طفيفة مثل الصداع أو الخفقان
- احمرار الوجه، تورم اليد أو القدم
- التأثيرات النادرة جدا
- دوخة صدمية لدى المرضى الذين يعانون في السابق من مرض شرايين (تأثير الرجوع الفعول "المحاذير عند تناول كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق")
- شرى، حرق، وحاشي
- التأثيرات ذات الفعول غير المعروفة
- التهاب كبد، خاصة بسبب إسهال السبيل الصفراوي
- تضخم كبد وولون
- إذا لاحظت أي تأثيرات جانبية غير متوقعة في هذه الفترة الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي

5. كيفية حفظ كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي كزاترال إس آر 5 ملغ. أقراص مغلفة بطبقة رقيقة مغلوطة الإطلاق

المكونات الأخرى

محتويات الكفاف الخارجي

حامل رخصة الشركة والشركة المشفلة

Sanofi-aventis France

Sanofi Winthrop Industrie

المصنع

تمت الموافقة على هذه النشرة للمرة الأخيرة في آذار 2009

ان هذا الدواء

مستحضر يوزع على صحتك وملكه خلافا للتعليمات بعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك

الطبيب والصيدلي هما الذين يبرران في الدواء وفي نفعه وشره

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك

لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالية العرب

THIS MEDICAMENT

Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.

Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.

Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists.

236413

4