Xatral® XL 10 mg

كزاترال® إكس إل 10 ملغ

أقراص مطوّلة الإطلاق

ألفوزوسين

الرجاء قراءة هذه النشرة بدقة قبل البدء باستعمال هذا الدواء.
- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أتى شكوك، إستشر الطبيب أو الصيدلي للمزيد من المعلومات.
- لقد وُصف هذا الدواء لك أنت شخصياً، لا يجدر بك إعطاؤه للآخرين فقد يؤذيهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك.
- إذا تفاقم أحد التأثيرات الجانبيّة أو إذا لاحظت أيّ تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تُعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق وما هي دواعي استعماله؟
2. قبل أن تتناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق
3. كيف تتناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف تحفظ كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق
6. معلومات إضافيّة

1. ما هو كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق وما هي دواعي استعماله؟

حاصرات ألفا

ينتمي هذا الدواء لفئة الأدوية المسمّاة حاصرات ألفا

يوصف هذا الدواء للعلاج الأعراضيّ للإشارات الوظيفيّة لتضخّم البروستات الحميد (زيادة حجم البروستات).

يوصف هذا الدواء أيضاً كعلاج مساعد لفترة المثانة عند احتباس البول الحاد المتعلق بتضخم البروستات الحميد.

2. قبل أن تتناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

لا تتناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق في الحالات التالية:
- حساسيّة معروفة ضدّ الألفوزوسين و/أو ضدّ مركّب آخر من مركّبات الدواء؛
- نقص الضغط الوضعي (شعور بالدوار يحدث عادة عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف)؛
- قصور في وظيفة الكبد (القصور الكبدي)؛
- قصور حاد في وظيفة الكلى؛
- بالتزامن مع الريتونافير.

إعتمد حذراً خاصاً مع كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق:

تحذيرات

قد يكون بعض المرضى حسّاسين بصورة خاصة تجاه **كزاترال إكس إل 10 ملغ**، مما يسبب لهم هبوطاً في ضغط الدم عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف، قد يحدث هذا التأثير في الساعات القليلة الأولى بعد تناول الدواء ويكون مصحوباً بالعوارض التالية: دوار، تعب، تعرّق.

يجب أن يبقى المريض مستلقياً حتى تختفي بالكامل هذه العوارض العابرة.

يوصى باعتماد الحذر بخاصة لدى المسنّين والمرضى الذين تعرّضوا لهبوط حاد في ضغط الدم بعد تناول دواء من الفئة نفسها (حاصرات ألفا).

تناثر القزحيّة الرخوة خلال الجراحة:

إذا كنت ستخضع لجراحة العين (بسبب عدسات معتمة) في المستقبل القريب وإذا عولجت في السابق أو كنت تعالج حالياً بـ**كزاترال إكس إل 10 ملغ**، أعلم طبيب العيون قبل العمليّة، إذ إنّ هذا الدواء قد يسبّب تأثيراً جانبياً قد يسبّب مضاعفات خلال العمليّة. ولكن في حال تمّ إعلام الجرّاح مسبقاً، سوف يتّخذ الاحتياطات اللازمة، حسب علاجك خلال العمليّة.

أعلم طبيبك إذا كنت مصاباً بمرض في القلب.

يحتوي هذا الدواء على لبلاكتوز، وهو الذي قد يسبّب اضطرابات في الجهاز الهضمي (تأثير ملين خفيف، اسهال).

المحاذير عند تناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

أعلم طبيبك إذا كنت مصاباً بمرض في القلب، خاصة في حال كنت تعاني من مرض الشريان التاجي.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

بغية تفادي أيّ تفاعل بين عدّة أدوية، لا سيّما بعض الأدوية المستعملة لضغط الدم أو بعض الأدوية المضادة للفطر (كيتوكونازول، إيتراكونازول)، أو بعض المضادات الحيويّة (كلاريثرومايسين، إيريثرومايسين)، يجب عليك أن تعلم الطبيب أو الصيدلي بأيّ علاج آخر تخضع له.

الحمل والإرضاع

لا يُستعمل هذا الدواء لدى النساء.

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال أيّ دواء.

القيادة واستعمال الآلات

يجب لفت نظر السائقين ومشغلي الآلات، إلى خطر التعرّض لنقص ضغط الدم الوضعي (هبوط في ضغط الدم عند الوقوف يرافقه دوار أحياناً)، أو للشعور بالدوار أو للتعب أو لاضطرابات بصريّة بخاصة عند بداية العلاج.

الأسوغة ذات المفعول المعروف: زيت الخروع المهدرج

3. كيف تتناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

كيفيّة تناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

عبر الفم.

ما هو عدد أقراص كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق الذي يجب تناوله

تبلغ الجرعة العاديّة قرصاً واحداً في اليوم تؤخذ مباشرة بعد وجبة العشاء.

يجب ابتلاع الأقراص كاملة مع كوب من الماء.

لا يجب مضغ الأقراص، أو علكها، أو سحقها أو طحنها لتصبح كالذرور.

عند القسطرة يجب تناول القرص منذ اليوم الأوّل من قسطرة الإحتباس.

إذا شعرت ان مفعول **كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق** قوي جداً أو ضعيف جداً، استشر طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت كميّة كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق أكثر مما يجب،
استشر طبيبك أو الصيدلي فوراً.

إذا نسيت تناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق،
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعوّض عن الجرعات الفرديّة التي نسيتها

4. التأثيرات الجانبيّة الممكنة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبّب **كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق**، تأثيرات جانبيّة

التأثيرات الشائعة

- دوخة، دوار، إغماء، صداع
- اضطرابات معديّة معويّة مثل الغثيان، ألم المعدة.
- شعور بالتعب

التأثيرات غير الشائعة

- نوبات دوار، تعاس؛
- هبوط في ضغط الدم عند الانتقال من وضع الاستلقاء إلى الوقوف.
- تسارع سرعة القلب، خفقان، غشيان؛
- إسهال، جفاف الفم
- احتقان الأنف .
- ارتكاسات جلديّة مثل الطفح أو الحكاك.
- إحمرار الوجه، أوديما، ألم في الصدر؛

التأثيرات النادرة جداً

- نوبة صدريّة لدى المرضى الذين عانوا في السابق من مرض شريانيّ تاجيّ (راجع الفقرة "المحاذير عند تناول كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق")؛
- شري، خزب وعائي

التأثيرات ذات التواتر غير المعروف

- التهاب الكبد، خاصة بسبب انسداد السبيل الصفراوي؛
- انتصاب مؤلم ومطوّل

إن لاحظت أيّ تأثيرات جانبيّة غير مذكورة في هذه النشرة، الرجاء أن تُعلم الطبيب أو الصيدليّ

5. كيف تحفظ كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

أبقِ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.

لا تستعمل كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الاطلاق بعد انقضاء تاريخ الصلاحيّة المدوّن على العلبة الخارجيّة.

إحفظ الدواء على حرارة لا تتعدّى 30 درجة مئويّة.

لا ينبغي التخلّص من الأدوية في المياه المبتذلة أو النفايات المنزليّة. إسأل الصيدليّ عن الطريقة المناسبة للتخلّص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة

6. معلومات إضافيّة

ماذا يحتوي كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق

المادّة الفاعلة هي:

هيدروكلوريد الألفوزوسين..... 10 ملغ

المركّبات الأخرى هي: هيبروميلوز، زيت الخروع المهدرج، إيثيل سلولوز، أكسيد الحديد الأصفر (E 172)، سيليكا غروائيّة مميّهة، ستيارات المغنيزيوم، مانيتول، بوفيدون، سلولوز دقيق البلّورية لقرص واحد مطوّل الإطلاق.

كيف هو شكل كزاترال إكس إل 10 ملغ، أقراص مطوّلة الإطلاق وما هي محتويات العلبة

أقراص مطوّلة الإطلاق (علب من 30 أو 50).

حامل رخصة التسويق والشركة المشغلة

sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France

المصنعون

Sanofi Winthrop Industrie
30 – 36, avenue Gustave Eiffel
37100 Tours – France

تاريخ الموافقة الأخير على النشرة: آذار 2009.

ان هذا الدواء

• يتحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و في نفعه و ضرره
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب
- لا تترك الادوية في متناول الاطفال.

مجلس وزراء الصحه العرب
واتحاد الصيادلـه العرب.