

Ipradol® comprimés à 0,5 mg

Fabricant

HAFSLUND NYCOMED PHARMA AG, Linz

Composition

Chaque comprimé contient 0,5 mg de sulfate d'hexoprenaline.

Propriétés et effets

Les comprimés IPRADOL* à 0,5 mg ont une action antispasmodique sur la musculature des bronches et empêchent par administration régulière les suffocations occasionnelles qui se manifestent au cours des maladies des voies respiratoires à caractère spastique.

Indications

Traitements et prévention de la dyspnée en cas d'asthme bronchique, de bronchite spastique, de bronchite chronique et d'emphysème.

Posologie et mode d'administration

Observer le dosage, sauf avis contraire du médecin.

Adultes:

3 x 1 jusqu'à 3 x 2 comprimés par jour, ou 1 comprimé toutes les 4 heures.

Enfants

3 — 6 mois	1/4 comprimé	1 à 2 fois par jour
6 — 12 mois	1/4 comprimé	1 à 3 fois par jour
1 — 3 ans	1/4 à 1/2 comprimé	1 à 3 fois par jour
3 — 6 ans	1/2 comprimé	1 à 3 fois par jour
6 — 10 ans	1 comprimé	1 à 3 fois par jour

Ingérer les comprimés avec un peu de liquide une 1/2 heure avant les repas.

Contre-indications

Ne pas prendre IPRADOL* dans les cas suivants:

maladies cardiaques spécifiques, infarctus cardiaque récent, hypertension très élevée, maladies hépatiques et rénales graves, hyperfonctionnement de la glande thyroïde, cataracte verte.

Grossesse et période de lactation:

Pendant la grossesse ou la période de lactation, il ne faut pas appliquer l'IPRADOL* sans autorisation formelle du médecin.

Effets secondaires

Pendant le traitement il peut se produire, en particulier en cas de doses élevées, une nervosité, étourdissement, tremblement léger des doigts, transpiration, palpitations, accélération du pouls (plus de 100 battements/minute) et des douleurs cardiaques peuvent se manifester. Dans des cas particuliers, il y a possibilité de nausées, d'envie de vomir et de vomissements.

Interactions

L'association d'IPRADOL* et quelques autres médicaments risque d'entrainer des effets reciproques.

Certaines préparations contre l'hypertension (p. ex. les bloqueurs de récepteurs bêta) diminuent l'action d'IPRADOL* ou même l'antagonisent. Les effets des remèdes contre le diabète sont renforcés.

Certains médicaments circulatoires et anti-asthmatiques (préparations avec une action sympathomimétique) renforcent avant tout les effets secondaires (palpitations, accélération du pouls) d'IPRADOL*.

IPRADOL* ne doit pas être associé aux alcaloïdes d'ergot.

En cas d'utilisation simultanée avec certains anesthésiques (p. ex. l'halothane), l'apparition de troubles du rythme cardiaque est possible.

Chez la femme enceinte il faut éviter d'appliquer l'IPRADOL* en même temps que du calcium, des préparations contenant de vitamine D, et du dihydrotachystérol.

Pour cette raison, faites savoir à votre médecin quels médicaments vous prenez en ce moment et spécialement si ceux-ci ont été prescrits par un autre médecin.

Effets d'accoutumance

Non observés jusqu'à présent.

Précautions particulières pour une utilisation sûre

En cas de contre-indications ou en cas d'apparition d'effets secondaires (symptômes), informer votre médecin.

Chez les diabétiques, des contrôles de glycémie doivent être effectués à intervalles réguliers.

Informez votre médecin si vous tombez enceinte pendant le traitement avec IPRADOL*.

Attention à la date d'expiration!

Tenir hors de la portée des enfants!

Présentation

20, 100 comprimés

Conseils de conservation

Conserver à l'abri de la lumière et dans l'emballage d'origine.

Pour les plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

HAFSLUND NYCOMED PHARMA AG

Linz, Autriche

7806030
9205/17z (1)
Code 610