

## كوسوبت®

هيدروكلوريد دورزوليميد/تيمولول مالت

#### المعلومات الطبية للمستهلك

##### محتوى النشرة

تجيب هذه النشرة عن بعض الأسئلة الدارجة عن قطرة كوسوبت. لكنّ النشرة لا تحتوي على جميع البيانات المتاحة.

إلا أنّ ذلك لا يعني عن التحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني.

فالأدوية جميعها لها مخاطر وفوائد. إذاً فقد فكر الطبيب بعناية في مخاطر استخدام قطرة كوسوبت في مقابل الفوائد التي من المنتظر أن تعود عليك.

وإذا كان لدى المريض أي أسئلة حول استخدام هذا الدواء، فيُرجى سؤال الطبيب أو الصيدلاني.

يُرجى الحفاظ على هذه النشرة مع الدواء.

قد يحتاج المريض إلى قراءتها مرة أخرى.

##### بواعي استعمال قطرة كوسوبت

تُستخدم قطرة كوسوبت لتخفيف ارتفاع الضغط في العينين لعلاج المياه الزرقاء. المياه الزرقاء حالة مرضيّة قد يرتفع فيها ضغط السائل في العينين. ومع ذلك، قد يكون لدى بعض المرضى المصابين بالمياه الزرقاء ضغط طبيعي في العينين. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتعرّض بعض المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العينين للإصابة بالمياه الزرقاء.

تحدث المياه الزرقاء عادة نتيجة تراكم السائل المتدفّق عبر العين. ويحدث هذا التراكم بسبب استنزاف السائل في العينين ببطء شديد أكثر من ضخّه إليها. ونظرًا لاستمرار دخول السائل الجديد إلى العينين، فعلاً عن السائل الموجود بهما بالفعل، يواصل الضغط ارتفاعه. وقد يُسبب هذا الارتفاع في الضغط تلفًا في الجزء الخلفي من العينين؛ مما يؤدي إلى فقدان تدريجي في الرؤية. وقد يتطور تلف العينين ببطء شديد بحيث لا يعلم المريض بقدرانه التدريجي في الرؤية. وحتى في بعض الأحيان يصاحب ضغط العينين الطبيعي تلف في الجزء الخلفي من العينين.

عادةً لا توجد أعراض لمرض المياه الزرقاء. ولكنّ الطريقة الوحيدة للتعرف على الإصابة بالمياه الزرقاء في فحص ضغط العينين والعصب البصري ومجال الإبصار على يد أحد متخصصي طب العيون أو طبيب عيون. وإذا لم تخضع المياه الزرقاء للعلاج، فقد تؤدي إلى مشكلات خطيرة. وقد لا تصاب بأعراض، إلا أنّ المياه الزرقاء قد تؤدي في النهاية إلى العمى الكلي. وفي حقيقة الأمر، عدم معالجة المياه الزرقاء أكثر أذى للأسباب شيوعًا للإصابة بالعمى.

وبالرغم من أنّ قطرة كوسوبت تساعد على التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنّها لا تشفيها.

تحتوي قطرة كوسبت على مادتين فعّلتين، هما هيدروكلوريد دورزوليمد وتيمولول مالتات. تخفف كلتا المادتين الفعّلتين من الضغط داخل العين عن طريق تقليل إنتاج السائل، إلا أنّهما ينجزان ذلك بطرق مختلفة.

ويتميّز هيدروكلوريد دورزوليمد إلى عائلة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات الأنهيدراز الكربونية. بينما ينتمي تيمولول مالت إلى عائلة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات الأنهيدراز الكربونية.

لا تُسبب قطرة كوسوبت الإدمان.

##### قبل استعمال قطرة كوسوبت

##### موانع الاستعمال

يُرجى تجنب استعمال قطرة كوسوبت إذا كان المريض مصابًا بحساسية منها أو أي من المكونات المذكورة في نهاية هذه النشرة.

يُمنع استعمال قطرة كوسوبت في الحالات التالية:

- إذا كان المريض مصابًا الآن أو سبق له أن أصيب في وقت سابق بمشكلات حادة في التنفس مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (انتفاخ الرئة)، أو غير ذلك من مشكلات التنفس
- إذا كان المريض مصابًا ببعض الحالات المرضيّة بالقلب، مثل بطء معدل ضربات

القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو قصور القلب.

**يُرجى عدم استعمال قطرة كوسوبت إذا كانت المرضيّة تُرضع رضاعةً طبيعية أو تعتزم ذلك.**

قد يمتص طفّل المرضيّة هذا الدواء من لبن الأم، ومن ثمّ توجد احتمالية لتعرّض الطفل للآذى.

**يُرجى عدم وضع قطرات العين بداخل العينين عند ارتداء عدسات لاصقة.**

قد تترك المادة الحافظة في قطرة كوسوبت (كلوريد البنزلكونيوم) أثرًا على العدسات اللاصقة اللينة. لذا؛ يمكن للمريض وضع العدسات اللاصقة مرة أخرى في العينين بعد مرور 15 دقيقة من الانتهاء من استعمال قطرة كوسوبت.

**يُمنع استعمال قطرة كوسوبت في الحالات التالية:**

- كسر العدسة المحيطة بالعداء
- كنا بدا على الزجاجاة علامات العثّ بها
- انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية على الجوة
- فيذا استخدم المريض هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية، فربما لا يؤدي عمله.
- في حالة عدم التأكد مما إذا كان ينبغي البدء في استعمال قطرة كوسوبت أم لا، يُرجى التحدث إلى الطبيب.
- توجد تجارب محدودة لفترة استعمال قطرة كوسوبت مع الأطفال.

**قبل البدء في استعمال الدواء**

تحدث إلى الطبيب في الحالات التالية:

- إذا كانت المرضيّة حاملًا أو تعتزم ذلك
- إذا كنت مصابًا بمخاطر استعمال قطرة كوسوبت وفرادها أثناء الحمل، ومن ثمّ قد يُتخذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي استعمالها أم لا.
- إذا كنت مصابًا بأي حالات مرضيّة، لا سيما ما يلي:

- مشكلات في القلب (مثل مرض القلب التاجي، أو قصور القلب، أو انخفاض ضغط الدم)
- اضطراب إيقاع في معدل ضربات القلب (مثل بطء معدل ضربات القلب أو عدم انتظامها)
- مشكلات في ضعف البؤرة البؤرية (مثل متلازمة رينو)
- مشكلات في الرئة أو التنفس (مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن)
- مرض السكري أو غيره من مشكلات السكر في الدم
- مرض بالغدة الدرقية
- مرض بالكلّي
- مرض بالكبد

##### 3. إذا كان المريض يعاني من حساسية تجاه أدوية السلفوناميد

أحد المكونات الفعّلة لقطرة كوسوبت، هيدروكلوريد دورزوليميد، هو من المكونات المرتبطة بالسلفوناميد. ومن ثمّ إذا كان المريض مصابًا بحساسية تجاه أدوية السلفوناميد، فقد يعاني من حساسية تجاه قطرة كوسوبت. ومن ثمّ تُربط الومع إلى الطبيب أو الصيدلاني في حالة عدم التأكد من الحساسية تجاه أدوية السلفوناميد.

3. إذا كان المريض يستعمل بالفعل قطرة أخرى من نوع مثبطات بيتا

لا يُوصى باستعمال قطرتين من مثبطات بيتا في نفس الوقت.

5. إذا كان لدى المريض تاريخ مرضي لمشكلات الحساسية، بما في ذلك الإكزيما، والحُمى القراصية أو حمى القش.

6. إذا كان المريض يعاني من أي حساسية تجاه أي أدوية أخرى أو أي مواد أخرى، مثل الأطعمة أو المواد الحافظة أو الصبغات.

إذا لم يبلغ المريض طبيبٍ حول أي مما سبق، فيُرجى إبلاغه قبل استعمال قطرة كوسوبت.

يُرجى من المريض إبلاغ الطبيب قبل إجراء عملية جراحية باستعماله قطرة كوسوبت؛ حيث قد تُغيّر القطرة من تأثيرات بعض الأدوية أثناء التخدير.

تتأثر الأدوية الأخرى

يُرجى التحدث إلى الطبيب في حالة تناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي يشرتها المريض من دون وصفة طبيّة من الصيدلية أو المحلات التجارية الكبرى أو محلات الأطعمة الصحيّة. فقد تتعارض بعض الأدوية وقطرة كوسوبت مع بعضها البعض. وتتضمن تلك الأدوية ما يلي:

- الأدوية المستخدمة لارتفاع ضغط الدم أو لعلاج المرضيّة بالقلب، بما في ذلك مجموعة من الأدوية تُسمى مثبطات بيتا
- الكينيدين، وهو أحد الأدوية المستخدمة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب
- الأدوية التي تُعالج مرض السكري
- الأقراص المستخدمة لعلاج المياه الزرقاء
- الكيمياء الكبيرة من الأسبرين أو الساليسيلات
- الأدوية التي تُعالج الاكتئاب أو

قد تتأثر تلك الأدوية بقطرة كوسوبت، أو قد تؤثر في فعّاءة عملها. لذا ربما يحتاج المريض إلى كميات مختلفة من أدويته، أو قد يحتاج إلى تناول أدوية مختلفة.

ولدى الطبيب أو الصيدلاني مزيد من المعلومات حول الأدوية التي ينبغي تجنبها منها أو تجنبها أثناء استعمال قطرة كوسوبت.

##### طريقة استعمال قطرة كوسوبت

الكمية المستخدمة

سوف يخبر الطبيب مريضه بعدد القطرات التي يحتاج إلى استعمالها كل يوم.

يُرجى عدم استعمال قطرة تروكوسيت سوى بوصفّة طبيّة من الطبيب.

وتُبلغ الجرعة المعتادة للبالغين قطرة واحدة من كوسوبت مرتين في اليوم في إحدى العينين أو كليتهما.

يُرجى اتباع جميع التوجيهات التي أعطاها الطبيب بخطابته

وقد تختلف هذه التوجيهات عن المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة.

**يُرجى استخدام قطرة كوسوبت يوميًا، في نفس الموعد تقريبًا من كل يوم، ما لم ينكر الطبيب للمريض خلاف ذلك.**

سيكون لاستخدام قطرة العين في نفس التوقيت التأثير الأمثل على ضغط العين. وسيساعد المريض كذلك على تذكر وقت استعمال القطرة.

بعد استخدام قطرة كوسوبت؛ يُرجى الانتظار لمدة 10 دقائق على الأقل قبل وضع أي قطرة أخرى في العينين.

##### طريقة استعمال قطرة كوسوبت

قد يجد المريض من الأسهل وضع قطرات في عينيه أثناء الجلوس أو الاستلقاء.

**وقبل فتح الزجاجاة في المرة الأولى، تأكد من عدم قطع شريط السلامة على الزجاجاة. فيذا**


**كان الشريط مقطوعًا، فيُرجى عدم استخدام الزجاجاة، وإعادتها إلى الصيدلاني.**

سيلاحظ المريض مساحة صغيرة بين الغطاء والزجاجاة - هذا الأمر طبيعي

**إذا كان المريض مرتديًا عدسات لاصقة لينة، فيُرجى إزالتها قبل وضع القطرة في العينين.**

1. يُرجى غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

2. افتح الزجاجاة للمرة الأولى، يُقطع شريط السلامة لكسر السدادة. ثمّ بعد ذلك، يمسك المريض الزجاجاة لأعلى، ويدير الغطاء في اتجاه الأسهم حتّى يتمكن من رفعها.



- يُرجى وضع الغطاء على رأسه (الأسهم جهة الأسفل) على سطح مستو. ويُمنع لمس الجزء الداخلي من الغطاء. فهذا سيساعد على نظافة الجزء الداخلي للغطاء، والوقاية من أي جراثيم بالقطرة.
- يُرجى الإمساك بالزجاجاة لأعلى بيد واحدة، بإصبع الإبهام أو السبابة على منطقة "finger push" (الضغط بالإصبع).



- باستخدام يدك الأخرى، يُرجى سحب جفك السفلي بلطف لتكوين جيبته.
- يُرجى إمالة الرأس إلى الخلف والنظر لأعلى.



- يضع المريض طرف الزجاجاة بالقرب من الجفن السفلي. ويُمنع لمس الزجاجاة للعين.
- يُحذر المريض بقطرة واحدة داخل الجيبته المكونة بين العين والجفن بالضغط على الزجاجاة بلطف.
- يُغلق المريض عينيه، يستمر في إغلاقها. ويُمنع الطرف بالعينين أو دحكهما.
- يضع المريض، أثناء إغلاق عينيه، إصبعه السبابة على الزاوية الداخلية للعين، ثمّ الضغط على الأنف أو الحلق، والتي قد يُمنّص منها الدواء في أجزاء أخرى من جسم المريض. يُرجى طلب مزيد من التعليمات المحددة من الطبيب حول هذا الأسلوب في الاستعمال.
- يضع المريض الغطاء مرة أخرى، ويقلعه بحكّام ويُرجى تجنب المداغلة في إحكام غلق الغطاء.

12. يخلل المريض يديه مرة أخرى بالماء والصابون لإزالة أي بقايا.

ويُنْتَظَر لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وضع العدسات اللاصقة مرة أخرى.

ويُحذَر لمس طرف القطرة أمام العين أو الجفن أو أي شيء آخر لتجنب تعرّض قطرة العين للتلوث.

فقد تسبب قطرة العين الملوّنة إصابة عين المريض بالعدوى

قد يشعر المريض بجلساس حارق طفيف في العين من استعمال قطرة العين.

فيإذا استمر هذا الحرقان، أو كان غير مريح بدرجة كبيرة، فيُرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلاني.

مدة الاستعمال

تستاعد قطرة كوسويت في التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنها لا تنفيها. لذا؛ يجب استعمال قطرة كوسويت كل يوم. ويُرجى الاستمرار في استعمال القطرة للمدة التي وصفها الطبيب.

عند تسعين استعمال الدواء

إذا حان وقت الجرعة التالية تقريبا، فيُرجى تجاوز الجرعة التي نسيها المريض، وأخذ الجرعة التالية عند حلول وقتها. وبدلاً من ذلك، يمكن استعمال القطرة وقتما يتذكر المريض، ثم العودة مجدداً إلى استعمالها كما هو معتاد.

وإذا لم يكن المريض متأكدًا من تجاوز الجرعة أو لا، فيُرجى التحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني.

يمنع مضاعفة الكمية لتعويض الجرعة الفائتة.

إذا كان لدى المريض مشكلة في تذكر استعمال القطرة، فيُرجى طلب بعض النصائح من الصيدلاني.

في حالة الاستعمال المفرط(الجرعة المفرطة)

إذا ظن المريض أن أي شخص أنه ربما ابتلع أياً من محتويات زجاجة كوسويت، أو أفرط في استعمال القطرة، فيُرجى على الفور الاتصال بالطبيب أو الذهاب إلى قسم الحوادث أو الطوارئ في أقرب مستشفى. ويرجى إجراء ذلك حتى إذا لم تكن شمة أي أعراض بالتعب أو التسمم

في حالة ابتلاع المريض من قطرة كوسويت عن طريق الخطأ، أو في حالة تجاوزه القطرات، قد يشعر بدوار أو دوخة، وقد يتعرّض للإغماء، أو يعاني من بطن شديد في معدل نبضات القلب، أو يعاني من صعوبة في التنفس أو التنفس بصعوبة.

أثناء استعمال قطرة كوسويت الأمور الواجبة على المريض تُرجع فحص ضغط العين عند طلب اختصاصي أمراض العيون لذلك؛ للتأكد من فاعلية قطرة كوسويت.

إذا تعرّض المريض لعدوى بالعين، أو تلقى إصابة بها، أو خضع لعملية جراحية بالعين، فيُرجى التحدث إلى الطبيب.

قد يطلب الطبيب من المريض استعمال زجاجة جديدة من قطرة كوسويت؛ نظراً لاحتمال تعرّض العبوة القديمة للتلوث، أو قد ينصحها بوقف العلاج بها.

إذا كانت المريضة حاملاً أثناء استعمال قطرة كوسويت، فيُرجى التحدث إلى الطبيب.

إذا كان المريض على وشك البدء في تناول أي دواء جديد، فيُرجى التحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني عند استعمال قطرة كوسويت.

موانع الاستعمال

يحظر إعطاء قطرة كوسويت لأي شخص آخر، حتى إذا كانت لديه نفس الحالة المرضية التي يعاني منها المريض.

يمنع التوقف عن استعمال قطرة كوسويت من دون التحدث إلى الطبيب أولاً.

ففي حالة التوقف عن استعمال القطرة، قد يتعرض ضغط العين إلى الارتفاع مجدداً، وقد تعرّض العين للضرر.

الأمور الواجب الحذر منها

يُرجى توخي الحذر عند القيادة أو تشغيل الماكينات إلى أن يعلم المريض مدى تأثير قطرة كوسويت.

وبوجه عام، لا تسبب قطرة كوسويت أي مشكلات على فترة الاستمارة أو تشغيل الماكينات. ومع ذلك، قد يسبب كوسويت عدم وضوح في الرؤية مع بعض الأشخاص. لذا؛ يُرجى أن يتأكد المريض من مدى تقاعله مع قطرة كوسويت أو من وضوح رؤيته قبل قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات.

الاثار الجانبية

يُرجى التحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني في أقرب وقت ممكن عند شعور المريض بالتعب أثناء استعمال قطرة كوسويت.

تسبب قطرة ترويسيت أغلب المرضى المصابين بارتفاع ضغط العين أو المياه الزرقاء، إلا أنها قد تخفّف آثاراً جانبية مع بعض المرضى. وقد يكون لجميع الأدوية آثار جانبية. أحياناً ما تكون هذه الآثار خطيرة، إلا أنها غير ذلك في معظم الأحيان. وقد يحتاج المريض إلى علاج طبي إذا تعرّض لبعض الآثار الجانبية.

لذا؛ يُرجى طلب الإجابة من الطبيب أو الصيدلاني على الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن المريض.

كما يُرجى التحدث إلى الطبيب إذا لاحظ المريض أيًا مما يلي وتسبب ذلك في قلقه:

• مشكلات في العينين مثل:

- عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو غير ذلك من مشكلات الإبصار
- تفاعلات حساسية، بما في ذلك إصابة العينين بالاحمرار أو الحكة أو الهياج
- حرقان وشعور باللسع في العينين، ألم في العين
- زيادة إفراز الدموع أو إفرازات العينين
- التهاب الملتحمة
- هياج في العين أو الشعور بوجود شيء ما في العين، جفاف العينين
- تورّم الجفنين أو تدميعهما

• صعوبة في التفكير أو العمل بسبب:

- الصداع
- التعب، الضعف
- صوت رنين أو طنين في الأذنين
- صعوبة في النوم، كوابيس
- تغيرات في الحالة المزاجية، مثل الاكتئاب أو فقدان الذاكرة

• مشكلات في الفم أو المعدة

- الشعور بالإعياء (غثيان)، اضطراب في المعدة، ألم في المعدة
- الإسهال
- مرارة أو اضطراب في التذوق، جفاف الفم

• مشكلات في الجهاز التنفسي

- السعال
- احتقان الحلق والتعب عند البلع

— البرد أو الأعراض المشابهة للإنفلونزا، مثل العطس أو رشح الأنف أو السعال أو احمرار الحلق أو إصابته بالعدوى

— الشعور بالتورّخ أو امتلاء الأنف أو الخدين أو خلف العينين، يصاحبه أحياناً ألم في الحفنان، والذي يُسمى أحياناً بالتهاب الجيوب

• تغيرات في الطريقة التي تشعر بها البدان والقمان، مثل:

- برودة اليدين أو القدمين
- تنميل في الأطراف وشعور بالوخز وتغيّر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرّضها للبرودة (ظاهرة رينو)
- الشعور بالتشنج أو الوخز في أصابع اليدين أو القدمين
- أعراض الإصابة بعدوى المسالك البولية، بما في ذلك الحاجة إلى التبول باستمرار، وبكميات صغيرة، أو حرقان مؤلم عند التبول

— ألم في الظهر

• نزيف الأنف

• تساقط الشعر أو تخفّفه

• تراجع الرغبة الجنسية

لذا؛ يُرجى التحدث إلى الطبيب فوراً عند ملاحظة أي من الآثار الجانبية التالية:

— سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، وهو ما يُعرف أحياناً باسم خفقان القلب

— بطن شديد في معدل نبضات القلب أو عدم انتظامها

— الدوخة والدوار، والذي قد يكون بسبب انخفاض ضغط الدم

— طفح جلدي، حكة جلدية

• تورّم اليدين أو القدمين أو الكاحلين

وقد تكون هذه الآثار الجانبية خطيرة. وقد تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

إلا أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث.

إذا حدثت أي من الأعراض التالية، فيُرجى التوقف عن استعمال قطرة كوسويت، والتحدث إلى الطبيب على الفور، أو الذهاب إلى أقرب قسم للحوادث أو الطوارئ في أقرب مستشفى:

- التنفس بصعوبة، صعوبة التنفس، ضيق في التنفس
- البهّة الشديدة في نبضات القلب، ألم في الصدر
- الإسهال

• تورّم الوجه أو الشفتين أو الفم أو اللسان أو الحلق، والذي قد يُسبب صعوبة في التنفس أو البلع

• يهدد تورّم تورمات خطيرة ومفاجئة ووردية اللون وشبيهة للحكة على الجلد، والتي تُعرف أحياناً باسم الحُمى القراصية أو حساسية الجلد

هذه آثار جانبية خطيرة. وقد تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة؛ إلا أن هذه الآثار الخطيرة نادرة الحدوث.

قد تحدث أيضاً آثار جانبية أخرى غير متوقعة أعلا مع بعض المرضى. لذا؛ يُرجى التحدث إلى الطبيب عند ملاحظة أي آثار أخرى.

يُرجى عدم القلق من هذه القائمة لآثار الجانبية المحتملة. فقد لا تعرّض لأي منها.

بعد استخدام قطرة كوسويت

التخزين

تُحفظ قطرة العين في مكان بارد. لا يخبزن في درجة حرارة أعلى من 25 درجة مئوية .

يمنع حفظ القطرة أو أي دواء آخر في الحمام أو بالقرب من المصير فـ.

يجب عدم ترك القطرة في السيارة أو على عتبات التوافذ.

يجب عدم حمل قطرة العين في جيوب الملابس.

فقد تؤدي الحرارة والرطوبة إلى تلف بعض الأدوية.

تُحفظ قطرة العين بعيداً عن الضوء.

تُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

ومن الأماكن الجيدة لتخزين الأدوية خزانة مغلقة تبعد عن الأرض متراً ونصف المتر على الأقل.

يجب عدم ترك الغطاء خارج الزجاجة لأي مدة لتجنب تعرّض القطرة للتلوث.

التخلص من القطرة

يُرجى كتابة تاريخ فتح قطرة العين على الزجاجة، والتخلص من أي محلول متبق بعد أربعة أسابيع.

تحتوي قطرة العين على مادة حافظة تساعد على الوقاية من الجراثيم التي تنمو في المحلول خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد فتح الزجاجة. وبعد هذه الفترة، توجد خطورة أكبر من تعرّض القطرة للتلوث، والتسبب في عدوى العين.

لذا؛ ينبغي فتح زجاجة جديدة.

إذا طلب الطبيب من مريضه إيقاف استعمال قطرة العين، أو أنها قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، فيُرجى سؤال الصيدلاني عما يجب فعله مع أي محلول متبق.

وصف المنتج

الشكل الدوائي

يأتي دواء كوسويت في صورة قطرات للعين في زجاجة 5 مل.

المكوّنات

المواد الفعّالة:

• هيدروكلوريد دوزولميد، بما يعادل 2% من دوزولميد كتلة/حجم

• تيمولول ماليت، بما يعادل 0.5% من تيمولول كتلة/حجم

المواد غير الفعّالة:

• سترات الصوديوم

• هيدروكسي إيثيل سيليلوز

• هيدروكسيد الصوديوم

• مائيتول

• مياه للحقن

• كلوريد البنزوكونيوم كمادة حافظة

الشركة المصنعة:

Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret  
Route de Marsat  
Roim 63200  
France

الشركة المالكة لحقوق التصويق:

Mundipharma Pty Limited, located at 88 Phillip Street, Sydney NSW 2000 Australia

أُعدّت هذه النشرة في مايو 2016.

