

ذلك، إذا نسيت وضع القطرات مرة أو أكثر، فواصل العلاج على النحو الموصوف لك حتى تتحدث إلى طبيبك. إذا كنت تستخدم أيضًا علاجات أخرى للعين، فانتظر 5 إلى 10 دقائق بين استخدام عقار توبريكس قطرات العين والأدوية الأخرى.

### الأثار الجانبية المحتملة

إذا لاحظت حدوث آثار جانبية، فلا توقف العلاج بعقار توبريكس قطرات العين دون التحدث إلى طبيبك. إذا كانت لديك أية مخاوف، فُرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك. من الممكن حدوث الآثار الجانبية التالية عند استخدام عقار توبريكس قطرات العين:

شائعة (تؤثر على مستخدم واحد حتى 10 مستخدمين من بين كل 100 مستخدم)

التأثيرات في العين: شعور بعدم الراحة، احمرار.

غير شائعة (تؤثر على مستخدم واحد حتى 10 مستخدمين من بين كل 1000 مستخدم)

التأثيرات في العين: التهاب القرنية، سحج القرنية (خدش بالعين)، اضطرابات الرؤية، عدم وضوح الرؤية، احمرار الجفن، تورم الملتحمة، تورم الجفن، ألم وجفاف بالعين، إفرازات من العين، حكة، زيادة إفراز الدموع.

التأثيرات في الجسم: حساسية (تفاعل حساسية)، صداع، شرى (أرتكاريا)، التهاب الجلد، تساقط الرموش، حكة جلدية، جفاف الجلد، فتقح لون الجلد.

حدثت الآثار الجانبية التالية بعد التسوية:

التأثيرات في العين: تفاعلات حساسية موضعية بالعين، تهيج العين، حكة بالجفون.

التأثيرات في الجسم: تفاعل فرط الحساسية، طفح جلدي، تفاعل جلدي شديد (متلازمة ستيفنز-جونسون)، تغيرات جلدية التهابية (احمرار متعدد الأشكال).

إذا لاحظت أية آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فأبلغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

### معلومات إضافية

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (= EXP) المطبوع على العبوة. بعد انتهاء العلاج، يرجى إعادة ما تبقى من السائل إلى المكان الذي حصلت عليه منه (طبيبك أو الصيدلي الخاص بك) حتى يتم التخلص منه على نحو ملائم.

عمر التخزين بعد الفتح

بمجرد فتح الزجاجه، ينبغي استخدامها في غضون 4 أسابيع.

تعليمات التخزين

لا تحفظ الدواء في درجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

معلومات إضافية

قم بإزالة حلقة الأمان غير المحكم بعد فتح الزجاجه لأول مرة. لتجنب إفساد تعقيم قطرات العين، تجنب ملامسة طرف قطارة الزجاجه لعينيك أو ليديك. أغلق الزجاجه بإحكام فوراً بعد استخدامها.

سيكون بإمكان طبيبك أو الصيدلي الخاص بك تزويدك بمعلومات إضافية، فلدعيم القدرة على الوصول إلى المعلومات الوصفية الكاملة.

### ما هي محتويات عقار توبريكس قطرات العين؟

المواد الفعالة

يحتوي كل 1 ملي لتر من عقار توبريكس قطرات العين على ما يلي: 3 مجم من التوبراميسين

المكونات الأخرى

يحتوي هذا الدواء على 0.1 مجم من كلوريد البنزلكونيوم في كل ملي لتر. يحتوي هذا الدواء أيضاً على حمض البوريك، سلفات الصوديوم غير المائي، كلوريد الصوديوم، تيلوكساويل، هيدروكسيد الصوديوم أو حمض الكبريتيك (لضبط درجة الحموضة) وماء منقى.

### التوافر / أحجام العبوات

يمكن الحصول على المنتج في الصيدليات بناءً على وصفة الطبيب، والتي يمكن استخدامها مرة واحدة.

حجم العبوة: قطارة بحجم 5 ملي لتر.

تم التصنيع بمعرفة

ألكون- كوفريور B-2870 بورس (بلجيكا) لصالح نوفارتس فارما إيه جي، بازل، سويسرا.

تمت آخر مراجعة لنشرة العبوة هذه من قبل الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (سويس ميديك) في يوليو 2020.

### هذا منتج واثي

- الدواء منتج يؤثر على صحتك وتناولُهُ على نحو مخالف للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع الوصفة الطبية بدقة وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.

تُحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

### معلومات للمرضى

يُرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء. تم وصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا تعطه لآخرين؛ قد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها. احتفظ بهذه النشرة، فقد ترغب لاحقاً في قراءتها مرة أخرى.

## توبريكس قطرات العين

### ما هو عقار توبريكس قطرات العين؟ وقيم يُستخدم؟

يحتوي عقار توبريكس قطرات العين على مضاد حيوي لعلاج عدوى العين. يتطلب هذا العلاج وصفة طبية، ولا يمكن استخدامه إلا إذا تم وصفه من قبل طبيبك.

### معلومات إضافية يجب أن تكون على دراية بها

توبراميسين، المضاد الحيوي الموجود في عقار توبريكس قطرات العين غير فعال في علاج جميع الجراثيم التي تُسبب عدوى العين. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ لهذا الدواء إلى حدوث مضاعفات. لذا، لا تستخدم عقار توبريكس قطرات العين أبداً لعلاج حالات أخرى أو أشخاص آخرين. وإذا أصبت لاحقاً بعدوى جديدة بالعين، يجب عليك عدم استخدام عقار توبريكس قطرات العين دون الحصول على وصفة طبية جديدة من طبيبك.

ملاحظة لم يرتدون العدسات اللاصقة

لا ترتد العدسات اللاصقة أثناء العلاج بعقار توبريكس قطرات العين. إذا سمح لك طبيبك بارتدائها، فقم بإزالتها قبل وضع العلاج وانظر لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد العلاج قبل وضع العدسات مرة أخرى.

### لا تستخدم عقار توبريكس قطرات العين في الحالات الآتية:

إذا كان لديك فرط الحساسية (الحساسية) المعروفة أو المشتبه بها تجاه أي من مكونات عقار توبريكس قطرات العين.

### تحذيرات واحتياطات

- إذا تعرضت لتفاعلات حساسية بالعين، على سبيل المثال: لسعة أو تورم بالجفن، أو احمرار العين، فأوقف العلاج واستشر طبيبك. قد تأخذ تفاعلات الحساسية أشكالاً مختلفة عدة، من الحكة الموضعية أو احمرار الجلد إلى تفاعلات الجلد الشديدة. قد تحدث تفاعلات الحساسية هذه أيضاً مع العلاجات الأخرى (سواء يتم استخدامها موضعياً أو جهازياً) التي تحتوي على مضاد حيوي من نفس النوع (الأمينوجليكوزيدات). إذا كنت تستخدم مضادات حيوية أخرى كعلاج بالتزامن مع عقار توبريكس قطرات العين، فاستشر طبيبك.
- قد يُضعف هذا الدواء قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات أو المعدات. إذا شعرت بعدم وضوح في الرؤية أو مشاكل أخرى بالرؤية بعد استخدام هذا الدواء، فيجب عليك تجنب القيادة أو استخدام الآلات حتى تزول تلك التأثيرات.
- يحتوي عقار توبريكس قطرات العين على كلوريد البنزلكونيوم، والتي قد تُسبب تهيج العين وتغير لون العدسات اللاصقة اللينة. تجنب ملامسة العقار للعدسات اللاصقة اللينة.
- قد يُسبب كلوريد البنزلكونيوم تهيج العين، خاصة إذا كان لديك جفاف بالعين أو اضطراب يؤثر على القرنية (الطبقة الشفافة الأمامية للعين). اتصل بطبيبك إذا شعرت بالحساسية غير طبيعي أو عانيت من حُرقة أو ألم بالعين بعد استخدام هذا الدواء.
- لا تستخدم عقار توبريكس قطرات العين لفترة مطولة.
- يُرجى إبلاغ طبيبك إذا كنت تعاني من أي أمراض أخرى أو حساسية، أو إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى (بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية)، أو تستخدم أية أدوية أخرى لعينيك، لا سيما إذا كانت من المضادات الحيوية.
- يُرجى استشارة طبيبك إذا كنت مصاباً أو قد أصبت من قبل بحالات مثل الوهن العضلي الوبيل أو مرض الشلل الرعاش (مرض باركنسون). فقد يؤدي ذلك النوع من المضادات الحيوية إلى تفاقم ضعف العضلات.
- يحتوي هذا الدواء على البورون مما قد يسبب مشاكل بالإنتجاب. لا تستخدم عقار توبريكس قطرات العين في الأطفال ممن تقل أعمارهم عن عامين. يُحظر إعطاء هذا الدواء للأطفال المصابين بعدوى شديدة ممن تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

### الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فلا تستخدمه إلا بعد موافقة صريحة من طبيبك.

### كيفية استخدام عقار توبريكس قطرات العين

هناك فقط خبرة محدودة بشأن استخدام عقار توبريكس قطرات العين في الأطفال الرضع بعمر أقل من شهرين؛ لذا لا يوصى بالاستخدام في الأطفال الرضع (انظر تحذيرات واحتياطات)

في العدوى الخفيفة إلى المعتدلة، قم بوضع قطرة واحدة إلى قطرتين في العين المصابة كل 4 ساعات ما لم يوجهك طبيبك بخلاف ذلك. في العدوى الشديدة، ضع قطرتين كل ساعة حتى تتحسن الحالة.

إذا وضعت كمية أكثر من اللازم من عقار توبريكس داخل عينك، فاشطفه من عينك بماء فاتر. لا تضع المزيد من القطرات حتى يحين موعد جرعتك التالية المقررة.

لا تغير الجرعة الموصوفة أو مدة العلاج من تلقاء نفسك. إذا كنت تعتقد أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أقل من اللازم، فاتصل بطبيبك أو بالصيدلي الخاص بك.

إذا أغفلت استخدام عقار توبريكس قطرات العين، فضع قطرة واحدة بمجرد أن تدرِك إغفالك استخدام عقار توبريكس، ثم واصل العلاج على النحو المقرر. لا تقم بوضع جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي أغفلتها. من المهم أن تستخدم عقار توبريكس قطرات العين بانتظام. مع