

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.** Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1. QU'EST-CE QUE CE MÉDICAMENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### **Classe pharmacothérapeutique**

Phytothérapie et éléments minéraux à visée sédatrice.

### **Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un léger calmant. Il est préconisé :

**chez l'adulte**, pour réduire la nervosité en cas de perception exagérée des battements cardiaques (palpitations) après que toute maladie cardiaque ait été écartée.

**chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 6 ans** en cas de troubles légers du sommeil.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

**Contre-indications :** Ne prenez jamais ce médicament en cas d'hypersensibilité à l'un des composants. *En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou votre pharmacien.*

**Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :** Chez l'enfant, un trouble du sommeil nécessite une consultation auprès de votre médecin.

**Interactions avec d'autres médicaments :** Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :** D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Pas d'effet particulier.

**Liste des excipients à effet notable :** Jaune orangé S (E 110)

## 3. COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

### **Posologie**

**Chez l'adulte : En cas de palpitations :** 2 comprimés 1 à 3 fois par jour avant les repas. **En cas de troubles mineurs du sommeil :** 2 comprimés au dîner, 2 comprimés au coucher.

**Chez l'enfant de plus de 6 ans : En cas de troubles mineurs du sommeil :** 1 comprimé au dîner, 1 comprimé au coucher.

**La forme comprimé n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.**

SI VOUS AVEZ L'IMPRESSION QUE L'EFFET DE VAGOSTABYL® COMPRIMÉ ENROBÉ N'EST PAS CELUI ATTENDU, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

**Mode d'administration :** Voie orale.

**Durée du traitement**

Le traitement ne doit pas être prolongé sans avis médical.

**Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Si vous oubliez de prendre VAGOSTABYL®, comprimé enrobé : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, VAGOSTABYL®, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

**5. COMMENT CONSERVER CE MEDICAMENT ?**

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**

Ne pas utiliser VAGOSTABYL®, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient VAGOSTABYL®, comprimé enrobé ?**

**Les substances actives sont :**

Extrait hydro-alcoolique sec d'aubépine ... 50,0 mg, extrait hydro-alcoolique sec de mélisse ... 45,0 mg, lactate de calcium pentahydraté ... 50,0 mg, thiosulfate de magnésium ... 10,0 mg, pour un comprimé.

**Les autres composants sont :**

Povidone K 30, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium, sepiFilm SN, saccharose, gélatine, gomme arabique, jaune orangé S (E 110), opaglos 6000.

**Forme pharmaceutique et contenu**

Comprimé enrobé en boîte de 40 ou 120.

**Titulaire :**

**Laboratoires MONIN**

68-88, rue Ampère - Z.I. des Chanoux  
93330 NEUILLY SUR MARNE

**Exploitant / Fabricant :**

**Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM**

68-88, rue Ampère - Z.I. des Chanoux  
93330 NEUILLY SUR MARNE

Information médicale : 01 49 44 29 29

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est octobre 2004.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.