

Ubretid® comprimés à 5 mg

Fabricant

NYCOMED Austria GmbH, Linz

Composition

1 comprimé contient 5 mg de bromure de distigmine

Propriétés et effets

UBRETID® produit une augmentation de l'activité de la musculature du tube gastro-intestinal. De plus il augmente le tonus de la vessie, ainsi que des sphincters, des uretères et de la musculature du squelette.

Indications

Atonie de la musculature intestinale après une opération.

Atonie de la musculature de la vessie et des uretères après une opération.

Troubles vésicaux d'origine nerveuse.

Miction involontaire.

Constipation chronique.

Dilatation massive de sections du colon.

Fatigue sévère des muscles (=myasthénie grave pseudoparalytique).

Mode d'administration et posologie

Respecter strictement les dosages prescrits, sauf prescription contraire. Commencer par 1 comprimé par jour. Selon les réactions, après la première semaine de traitement, on passera à des fréquences d'administration de 2 ou 3 jours (1 à 2 comprimés).

Si toutefois une grande partie de la quantité d'UBRETID® n'avait produit aucun effet, à cause d'ingestion de nourriture précédente ou simultanée à la prise du médicament, ceci ne doit en aucun cas être compensé par une reprise de la médication dans l'espace de quelques heures, car il se pourrait qu'une accumulation incontrôlée se produise.

La dose journalière est à prendre en une seule prise, à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner, avec un peu de liquide.

Contre-indications

UBRETID® ne doit pas être employé dans les cas suivants:

forte vagotonie (prédominance de la partie parasympathique du système nerveux autonome involontaire) accompagnée d'hypotension, d'activité cardiaque ralentie, augmentation de la production d'acide gastrique, mouvement péristaltique accéléré du tube digestif, salivation croissante, troubles d'irrigation sanguine périphérique, crampes de l'intestin, des voies biliaires et urinaires, ulcères gastriques, inflammation intestinale; hypotension, contraction musculaire élevée, crampes musculaires (tétanie), épilepsie, paralysie agitante (maladie de Parkinson), choc et crise circulatoire

postopératoire, faiblesse cardiaque non traitée, infarctus du myocarde, bronchite asthmatique.

Grossesse et période de lactation:

Pendant la grossesse ou la période de lactation, il ne faut pas appliquer l'UBRETID® sans autorisation formelle du médecin.

Effets secondaires

Nausées, vomissements, diarrhée, crampes intestinales, activité accrue de l'estomac, de l'intestin et de l'uretère, salivation et larmolement renforcées, états asthmatiques, pouls lent (moins de 60 battements/minute), rétrécissement de la pupille, transpiration, contractions musculaires, frémissement des muscles, défaillance musculaire, troubles d'avaler.

En cas d'absence de règles, UBRETID® peut déclencher de saignement.

Interactions

L'association de l'UBRETID® et quelques autres médicaments risque d'entraîner des effets réciproques. Les anticholinergiques comme l'atropine, médicaments influençant le comportement (substances psychopharmacologiques), remèdes contre les allergies, et certains médicaments (comme le curare) provoquant le relâchement des muscles, antagonisent l'action de l'UBRETID®; d'autres (p.ex. le suxaméthonium) en prolongent l'effet.

Certains antibiotiques (néomycine, streptomycine, canamycine) ont une légère action neuromusculo-bloquante et affaiblissent ainsi l'effet de l'UBRETID®.

Effets d'accoutumance

Inconnus jusqu'à présent.

Précautions pour une utilisation sûre

En cas de contre-indications ou en cas d'apparition d'effets secondaires (symptômes), informer de suite votre médecin.

Informez votre médecin, si vous êtes ou si vous tombez enceinte.

Attention: ce médicament peut perturber les réactions et la capacité de conduire.

Attention à la date d'expiration!

Tenir hors de portée des enfants!

Présentation

20, 50 comprimés

Conseils de stockage

Conservé à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

7812121
9812/frz ②
Code 1348