

لوكويد ليبوكريم * ٠.١ ٪

هيدروكورتيزون ١٧ بيوتيريت ١ ملغ لكل غ

معلومات للمستخدم

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى .
لو كانت لديك أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني.
لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً فلا تعطه للآخرين، فقد يضرهم حتى ولو كانت أعراضهم مماثلة لتلك تشكو منها.

محتويات هذه النشرة

١. ما هو لوكويد ليبوكريم وفيم يستعمل ؟
٢. ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام لوكويد ليبوكريم
٣. كيف يستعمل لوكويد ليبوكريم
٤. الآثار الجانبية المتوقعة
٥. كيف تحفظ لوكويد ليبوكريم

لوكويد ليبوكريم ٠.١ ٪، كريم

هيدروكورتيزون ١٧ - بيوتيريت. المادة الفعالة هي ١ ملغ هيدروكورتيزون ١٧ - بيوتيريت لكل غرام كريم.
السواغات الموجودة هي كحول ستوستياريلي، ماکروغول ٢٥ ستوستيارييل إثير، برفاين سائل، فازلين أبيض، بروبيل باراهيدروكسي بنزوات (E216)، كحول بنزيلي، حمض الستريك (E330)، سترات الصوديوم (E331) وماء منقى. يتوفر لوكويد ليبوكريم بوصفة طبية فقط .

١ . ما هو لوكويد ليبوكريم وفيم يستعمل ؟

كيف يبدو لوكويد ليبوكريم وما هي عوته
لوكويد ليبوكريم أبيض اللون، ومعبأ في أنابيب سعة ٣٠ غ . الأنبوب معبأ في علبة لونها أصفر/رمادي/أبيض طبع عليها
"Locoid Lipocream 0.1%".

كيف يعمل لوكويد ليبوكريم

يحتوي لوكويد ليبوكريم على كورتيكوستيرويد وهو يقلل بسرعة أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الحكة، الاحمرار، تكوّن القشور.
عامة، الكورتيكوستيرويدات لا تزيل سبب هذه الأعراض. تضمن قاعدة ليبوكريم أن يصبح الجلد أقل رطوبة.

ما هي دواعي استعمال لوكويد ليبوكريم؟

يمكن استعمال لوكويد ليبوكريم لعلاج الإصابات الجلدية السطحية التي كثيراً ما تصحبها حكة، احمرار وتكوّن القشور. ونظرا لاحتوائه على مادة دهنية أكثر من المعتاد، فهو مناسب للإصابات الجلدية التي يكون فيها الجلد جافاً نسبياً ولا يزال به بعض الرطوبة .

٢. ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام لوكويد ليبوكريم

- لا تستخدم لوكويد ليبوكريم
- لو كان مرضك الجلدي ناجماً عن عدوى بالبكتيريا، الفيروسات، الفطريات أو الطفيليات، لأنها قد تسوء أو تصعب غير ملحوظة .
- في حال الإصابة بحب الشباب، و في حال احمرار الجلد .
- للجروح أو الجلد القشري (الشماك) .
- لو كانت إصابتك الجلدية ناتجة عن علاج سابق بالكورتيكوستيرويدات مثل التهاب الجلد حول الفم أو الجلد الرقيق الذي قد يكون به خطوط ضامرة وأوعية دموية صغيرة هشة .
- في حالة طفح أحصص القدم لدى الأطفال .
- "في حالة فرط الحساسية تجاه هيدروكورتيزون ١٧- بيوتيريت أو لأي من السواغات (وهذا غير شائع). أنظر فقرة معلومات هامة" عن سواغات معينة في لوكويد ليبوكريم

كن حذراً عند استعمال لوكويد ليبوكريم في الحالات الآتية

- لو أردت علاج جلد الوجه، جلد الأعضاء التناسلية وثنايا الجلد، لأن هذه المناطق حساسة للكورتيكوستيرويدات بشكل خاص .
- لو استعملت الليوكريم مع ضئاد ساذ أو على مساحات واسعة من الجلد أو في علاج طفل. هذه الحالات يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب .
- يجب عدم استعمال الليوكريم في العين أو على الجفون .
- يجب تجنب استعمال الكورتيكوستيرويدات لمدة طويلة عند الأطفال .
- استشر طبيبك إذا انطبقت عليك أي من التحذيرات المذكورة أعلاه .

الحمل

استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال أي دواء. لو كانت هناك حاجة لاستعمال لوكويد ليبوكريم أثناء الحمل، استشيري طبيبك أولاً.

الإرضاع

استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال أي دواء. لو كانت هناك حاجة لاستعمال لوكويد ليبوكريم أثناء الإرضاع، فاستشيري طبيبك أولاً .

قيادة السيارة واستخدام الآلات

لا توجد معلومات عن تأثير لوكويد ليبوكريم على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات. على أي حال، ليس من المتوقع حدوث أية تأثيرات.

معلومات هامة عن مكونات معينة في لوكويد ليبوكريم

يحتوي لوكويد ليبوكريم على سواغات معينة (كحول ستوستيارييل وبروبيل باراهيدروكسي بنزوات) التي تسبب في حالات نادرة تفاعلات فرط حساسية في الجلد (حكة، بقع حمراء) .

استعمال لوكويد ليبوكريم بالاشتراك مع أدوية أخرى

أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى. وهذا ينطبق أيضاً على الأدوية التي تكون قد حصلت عليها دون وصفة طبية .

٣. كيف يستعمل لوكويد ليبوكريم

ضع طبقة رقيقة من لوكويد ليبوكريم على المنطقة المصابة من الجلد ودلكها برفق. لا تضعه أكثر من مرة إلى ثلاث مرات يومياً، إلا لو نصحك طبيبك بجرعة خلاف ذلك. عندما تتراجع الأعراض، قد يقرر طبيبك أن تستعمل ليبوكريم مرات أقل. بصفة عامة، يجب عدم استخدام أكثر من أنبوب إلى اثنين في الأسبوع .

ماذا يجب عليك عمله إذا استخدمت كمية زائدة من لوكويد ليبوكريم

أبلغ طبيبك أو الصيدلاني لو كنت استخدمت كمية زائدة من لوكويد ليبوكريم.

ماذا يجب عليك عمله إذا نسيت استعمال لوكويد ليبوكريم

لو كنت نسيت استخدامه في إحدى المرات استمر في استعماله بعد ذلك كالمعتاد. ليست هناك ضرورة لتعويض المرة التي نسيتها.

ما الذي يمكن توقعه عند إيقاف العلاج

يمكن للأعراض الأصلية أن تظهر من جديد لو أوقفت العلاج قبل انتهاء المدة المقررة له استشر طبيبك أو الصيدلاني دائماً قبل إيقاف العلاج.

٤. الآثار الجانبية المتوقعة

مثل كل الأدوية، قد يسبب لوكويد ليبوكريم آثاراً جانبية.
قد تشعر أحياناً بحرقة أو إحساس بالوخز في مكان الاستعمال، لكنه غالباً شعور غير خطير ويختفي من تلقاء نفسه.
إذا كنت قد استخدمته لمدة طويلة أو تحت الضماد، فقد يحدث طفح، بثرات صغيرة أو يتكون صديد. يمكن للون الجلد أن يتغير أو يصبح رقيقاً، وأحياناً يكون مصحوباً بخطوط دقيقة.
استشر طبيبك لو حدثت لديك أي من هذه الأعراض الجانبية. أيضاً لو حدثت أعراض جانبية أخرى غير المذكورة في هذه النشرة، أو أية أعراض أخرى تعتقد أنها قد تكون خطيرة، فاستشر طبيبك أو الصيدلاني.

٥. كيفية حفظ لوكويد ليبوكريم

يحفظ في العبوة الأصلية في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة م. لا يحفظ في البراد أو في التلاجة. لا تستعمله بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة بعد 'EXP'.

صاحب رخصة التسويق

شيلافارم أرزنايميتل جي إم بي إتش
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany

الجهة الصانعة

تيملر إيطاليا إس آر إل
Temmler Italia S.r.l., Via delle Industrie 2, 20061 Carugate (MI), Italy

إن هذا الدواء

- الدواء مضحضر يؤثر على صحتك، استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرّضك للخطر.
- تقيّد بوصفة الطبيب، وبطريقة الاستعمال المدوّنة، وتعليمات الصيدلاني الذي صرف لك الدواء.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء نفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المعدّدة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر استعمال نفس الوصفة دون مراجعة الطبيب.
- احتفظ بكافة الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال .

**مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالة العرب**

تاريخ آخر مراجعة واعتماد لهذه النشرة :
سبتمبر ٢٠٢١