

Zeefra 500 mg

(Céfradine (DCI))

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DÉNOMINATION : Zeefra 500 mg

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Céfradine 500 mg

Excipients : talc, stéarate de magnésium, lactose.

Enveloppe de la gélule : gélatine, indigotine, dioxyde de titane, érythrosine, oxyde de fer jaune.

c) FORME PHARMACEUTIQUE : 12 gélules.

d) CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : ANTI-BIOTIQUES ANTIBACTÉRIENS de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de première génération. (J : anti-infectieux)

e) NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT : Laboratoires DOMS-ADRIAN - 4, rue Ficatier - 92400 COURBEVOIE - FRANCE

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT : Laboratoires MACORS - Z.I. La Plaine des Isles Rue des Callottes - 89000 AUXERRE - FRANCE

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

3. ATTENTION !

a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS) : Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ : - dans le cas d'une allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, - chez l'enfant de moins de 6 ans en raison de la forme pharmaceutique.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDES SPÉCIALES : Toute manifestation allergique (éruptions cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.

Avant de prendre ce traitement, prévenir votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur vous avez présenté une réaction allergique : urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, œdème de Quincke (variété d'urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou).

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN en cas de : - d'insuffisance rénale, - d'antécédents allergiques, notamment aux antibiotiques.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE ET ALLAITEMENT : En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption de la peau, candidose (affection due à certains champignons microscopiques), avertissez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir car ces effets sur votre enfant sont peut-être dus à ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

a) POSOLOGIE : A titre indicatif, la posologie usuelle est de : • chez l'adulte : 2 g par jour • chez l'enfant de plus de 6 ans : 50 à 100 mg/kg par jour.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale. Les gélules sont à avaler avec un demi verre d'eau.

c) FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ : A prendre au cours des repas.

d) DURÉE DU TRAITEMENT : Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

e) CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE : Prévenir immédiatement le médecin traitant.

f) CONDUITE A TENIR AU CAS OÙ L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE : Prévenir le médecin traitant.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : - Manifestations digestives : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, douleurs abdominales.

- Manifestations allergiques : prurit (démangeaisons), éruptions cutanées, urticaire (éruptions cutanées identiques à celles provoquées par la piqûre d'ortie). - Manifestations hématalogiques : éosinophilie, thrombocytémie (augmentation de la quantité de certains éléments du sang). - Élévation transitoire du taux sanguin de certaines enzymes du foie (transaminases). - Altération du rein, surtout en association avec les aminosides (antibiotiques) ou les diurétiques.

SIGNELEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Octobre 1998.