

معلوكس
A02AD01
هيدروكسيد المغنيسيوم
و هيدروكسيد الألومنيوم

التركيب:

تحتوي كل 100 جرام من محلول المعلق على ما يلى:

عناصر فعالة:

هيدروكسيد المغنيسيوم 3,65 جرام
هيدروكسيد الألومنيوم 3,25 جرام

السواغ:

متل باراهيدروكسينزوات، بروبيل باراهيدروكسينزوات، حمض ليمونيك، سوربيتول محلول بنسبة 70%， مانيتول، خلاصة النعناع، سكرين الصوديوم، ماء مكررة.

كل قرص يحتوى على:

عناصر فعالة:

هيدروكسيد المغنيسيوم 400 ملجرام
هيدروكسيد الألومنيوم جيل جاف 400 ملجرام

السواغ:

مسحوق السكروز مع النشا، سوربيتول، مانيتول، ستيرات المغنيزيوم، مسحوق النعناع، سكرين الصوديوم، سكروز.

التعليم:

محلول معلق يؤخذ بالفم:

- قارورة فيها 200 ملليلتر
- عليه فيها 15 مظروف سعة 15 ملليلتر الواحد

أقراص تؤخذ بالفم:

- عليه فيها 40 قرص وزن الواحد منها 800 ملجرام

الفئة الطبية العلاجية:

ماقاوم للقرحة

صاحب الترخيص التجاري:

شركة أفينتس فارما المساهمة (AVENTIS PHARMA SpA)

5 ميدان س. تور - 20149 ميلانو (إيطاليا)

المصنع:

شركة أفينتس فارما المساهمة

11 جادة أوروبا - 21040 أوريجيوا (محافظة فاريزه) - إيطاليا

التعليمات:

كافية أنواع الحمضة المعدية المفرطة، والحرقة في فم المعدة الناشئة عن سوء الهضم، والقرحة المعدية الإلثى عشرية، وإلتهاب المعدة، والعصاب المعدى، وعندما ينبعى زيادة القدرة المعدية على تحمل الأدوية المهدجة، الخ.
تضاد الاستنباط:

لا وجود له.

تحذير:

في حال وجود قصور كلوى خطير من المستحسن تناول الدواء تحت إشراف الطبيب.

التفاعل مع أدوية أخرى:

لم تكن أملاح الألومنيوم والمغنيزيوم تحد من إمتصاص التيتراسيلكلين من قبل المعدة والإمعاء من المستحسن عدم تناول معلوكس أثناء العلاج بالتيتراسيلكلين بالفم.
حيطة خاصة: من المستحسن عدم تجاوز الجرعات المنصوص عنها.
الجرعات وطريقة ومدة استعمال هذا الدواء:

المحلول المعلق:

من 2 إلى 4 معلق أو مظروف واحد أو إثنان أربع مرات في اليوم، بعد نحو 60-20 دقيقة من تناول الطعام وقبل النوم.
بالإمكان تدويب الدواء في الماء أو الحليب.
خضوا الدواء جيداً قبل الإستعمال.
الأقراص :

مضغ أو صن قرص واحد أو قرصين اثنين، أربع مرات في اليوم ، بعد نحو 60-20 دقيقة من تناول الطعام وقبل النوم.
يمكن اتباع تناول الأقراص بجرعة من الماء أو الحليب.
الجرعات القوية جداً:

لا توجد حالات معلومة تم فيها تناول جرعة كبيرة جداً من الدواء بشكل عفوي أو مقصود مع ظهور عوارض تسمم. بجميع الأحوال من المستحسن عدم تجاوز الجرعات المذكورة هنا.
الآثار غير المرغوبة:

لاتوجد

في حال بروز آثار غير مرغوبة ندعو المريض لإبلاغ طبيه أو الصيدلي.
طريقة الحفظ:

المحلول المعلق: أبقوا الدواء تحت درجة حرارة لا تقل عن أربع درجات مئوية .

أبقوا على

القارورة مكونة مكتملة الإغفال

الأقراص: تحفظ تحت ثلاثين درجة مئوية.

تاريخ انتهاء مفعول الدواء:

يُعمل بتأريخ انتهاء مفعول الدواء المكتوب على العلبة فقط في حال بقى معلباً بشكل جيد وتم حفظ الدواء بشكل صحيح.
تحذير: لا تستعملوا الدواء بعد تاريX إقضاء فعاليته المدون على العلبة.

أبقوا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

تاريخ آخر مراجعة: يونيو 2002م.