

# Retacnyl 0,05%

trétinoïne

## CREME



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

### 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### DENOMINATION

RETACNYL 0,05 POUR CENT, crème

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Trétinoïne .....

0,05 g pour 100g de crème

Excipients : Stéarate de polyéthylène glycol, stéarate de glycérol et stéarate de polyéthylène glycol 100, alcool cétylique, alcool stéarylique, perhydroqualéne, butylhydroxyanisole, butylhydroxytoluene, parahydroxybenzoate de propyle, acide stéarique, carbomère (carbopol 981), glycérol, parahydroxybenzoate de méthyle, édétate de sodium, solution de triéthanolamine à 20%, myristate d'isopropyle, acide sorbique, eau purifiée.

#### FORME PHARMACEUTIQUE

Crème, tube de 30g.

#### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRÉPARATIONS ANTIACNÉIQUES À USAGE TOPIQUE

#### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza - La Défense 4  
20, avenue André Prothin  
92927 LA DEFENSE Cedex

#### NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires GALDERMA

Z.I. Montésir  
74540 Alby-sur-Chéran

### 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé :

- dans le traitement local de l'acné de sévérité moyenne,
- certains troubles de la kératinisation.

### 3. ATTENTION !

#### DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une augmentation des quantités appliquées n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait provoquer rougeur, désquamation et inconfort.

En raison de son activité, cette crème est normalement irritante pour la peau.

Un certain nombre de précautions doivent être prises pour limiter cet inconvenient :

- Eviter le contact de la crème avec les yeux, les paupières, les narines, la bouche. En cas de contact accidentel, effectuer un lavage soigneux à l'eau.
- Si avant le traitement, vous avez déjà été traité avec d'autres préparations locales exfoliantes, attendre la fin des phénomènes d'irritation de la peau avant de commencer le traitement.
- L'exposition au soleil et aux lampes à ultra-violet provoque une irritation supplémentaire. Eviter en conséquence une exposition pendant le traitement dans toute la mesure du possible. Le traitement pourra cependant être poursuivi si l'exposition est réduite au minimum (protection par le port d'un chapeau et l'utilisation d'une crème écran solaire) et le rythme des applications ajusté.

- En cas d'exposition exceptionnelle au soleil (une journée à la mer par exemple), ne pas appliquer la veille, le jour même et le lendemain. Si une exposition préalable a entraîné des brûlures (« coup de soleil »), attendre un complet rétablissement avant d'entreprendre le traitement.
- Vous pouvez utiliser les produits de maquillage et les produits hydratants de votre choix en les choisissant parmi les produits testés non comédogènes (demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

#### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

acide sorbique  
butylhydroxytoluène  
butylhydroxyanisole  
parahydroxybenzoate de méthyle et propyle

#### 4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

##### POSOLOGIE

Acné :

Appliquer généralement une fois par jour.

Si les réactions de la peau sont trop importantes, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin afin qu'il adapte le rythme des applications.

Troubles de la kératinisation :

Seul votre médecin peut déterminer le rythme des applications.

#### DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

##### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

###### VOIE CUTANEE

Appliquer une fine couche de crème après avoir lavé et bien séché la peau.

Se laver les mains après l'emploi du produit.

##### FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Appliquer en général le soir après la toilette.

##### DUREE DU TRAITEMENT

Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement après 4 à 8 semaines de traitement. Le traitement doit être poursuivi pendant au moins 3 mois.

Ce traitement d'attaque pourra être suivi d'un traitement d'entretien.

#### DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

#### 5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Des effets secondaires locaux peuvent apparaître occasionnellement sous forme de phénomènes irritatifs : rougeur diffuse, sensation de picotement, de sécheresse de la peau, légère desquamation. Ces phénomènes, directement liés à l'activité du produit, disparaissent toutefois lorsque l'on espace les applications.

Dans les premières semaines du traitement on peut observer une aggravation de l'acné, notamment de l'apparition de petites pustules à tête blanche. Cette réaction est normale, il s'agit de l'élimination accélérée des microkystes qui étaient en formation dans la profondeur de la peau.

En raison de la présence d'acide sorbique, risque d'urticaire.

En raison de la présence de butylhydroxytoluène et de butylhydroxyanisole, risque d'eczema, irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle et propyle, risque d'eczéma et exceptionnellement, risque de réactions allergiques avec urticaire et gêne respiratoire.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

#### 6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

#### PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à l'abri de la lumière.

#### 7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

04/2005

GALDERMA

