



دهان (كريم) نيسٽالوكال® Nystalocal معلومات للمرضى

هذا الدواء
مستحضر يؤثر على مستحكه، واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك. - الطبيب والصيدلي هما خبيران في الدواء وفي نفعه وضرره. - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك. - لا تعز سرف الدواء بدون استشارة الطبيب. - لا تترك الأدوية في متناول الأطفال. مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

ما هو دواء نيسٽالوكال وعتى يجري استعماله؟

نيسٽالوكال هو دواء ذو فعالية خاصة ضد أنواع عدوى فطريات الخمائر بالجلد (البشرة) والأغشية المخاطية. يتم استعمال هذا الدواء بناء على أمر الطبيب ويوصف طبياً منه في حالات الأمراض الجرثومية أو الميكروبية المثلثية شديدة العدوى ذات الإفرازات الرطبة (خصوصاً تلك التي تنتسب فيها فطريات الخمائر من فصيلة كانديدا) بالأغشية المخاطية والجلد أو البشرة.

يمكن بواسطة دهان (كريم) نيسٽالوكال علاج ومداداة التهابات التي تنشأ بسبب الإثارة أو التهيج من جراء استخدام القساط أو اللثة، والالتهابات بالأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، والالتهابات التي تحدث بقضيب (ذكر) الرجل وإكزيما الشرج.

متى لا يُسمح باستخدام دواء نيسٽالوكال؟

يجب عدم استعمال دهان (كريم) نيسٽالوكال في حالة الحساسية المفرطة لأي مادة من مواد تركيبه. كذلك يجب عدم استعمال هذا الدهان (الكريم) في مجال منطقة العينين أو وضعه على الجروح المفتوحة أو الالتهابات المتبقية ذات العدوى.

في حالة إذا كنتم تتعاون من عدوى المرض الجلدي المعروف باسم داء المنطفة أو القوياء المنطفية (مثلاً ظهور بتور الخُشْي، أو الطلع الجلدي أو جدري الماء (بثرات أو حبوب مندية) أو سَل الجلد، فلا يصلح العلاج بدواء دهان (كريم) نيسٽالوكال.

متى يتوجب اتخاذ الحيطة عند استعمال دواء نيسٽالوكال؟

نيسٽالوكال هو دواء فعال قوي الأثر فيترجب عدم تخطي المدة التي يحددها الطبيب للعلاج بهذا الدواء، وهي المدة التي تتراوح في العادة فيما بين أسبوعين (٢) إلى ثلاثة (٣) أسابيع، فمن الممكن أن تظهر أضرار بالجلد أو البشرة مع العلاج بهذا الدواء في غضون بضعة أيام أو في حالة تدهور الحالة المرضية، فتجب استشارة الطبيب، حيث إنه في مثل تلك الحالات يمكن أن يكون السبب هو حدوث عدوى معينة أو جراثيم ذات مناعة أو قليلة التأثير أو حتى وجود نوع من أنواع الحساسية. كذلك في حالة ظهور أعراض حساسية زائدة (مثل حكة أو حرش أو أكلان بالجلد أو حرقان شديد) فيجب التوقف عن استعمال هذا الدواء والاتجاه إلى استشارة الطبيب. كما يتعين إحاطة الطبيب علماً في حالة تفرق البشرة أو ضعف الجلد وحدث جروح به.

في كل الأحوال يجب تجنب استعمال هذا الدواء لمدة طويلة أو على مناطق متسعة (أكثر من عشرة من المئة (١٠٪) من سطح الجسم)، وكذلك يجب عدم دهنه على مناطق جلدية تنمسه (كالجروح المفتوحة، والمناطق المتضررة من البشرة، وثثايا الجلد وتجااعده، وحنايا المفاصل، وفيما بين أصابع اليدين والقدمين، وبالمناطق الحدودية بين الجلد والغشاء أو حول العينين).

عند معالجة إكزيما القساط أو اللثة تساعد الأقمطة الملوقة بشدة أو الأقمطة المرولية البلاستيكية على امتصاص المواد الفعالة ووصولها إلى مجرى الدم. لذلك فيتوجب بغير الإمكان اللجوء إلى استعمال أقمطة أو لفات من القماش بدون سراويل

بلاستيك. كما يتعين عدم استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال لمدة طويلة أو دهن هذا المرهم على مساحات واسعة من أجسامهم.

يجب أن يجري استعمال دواء نيسٽالوكال لعلاج الشكوى الجلدية الحالية فقط الذي وصفه الطبيب لعلاجها بالذات، وليس للحالات المرضية الجلدية الأخرى التي تظهر فيما بعد. يُحظر إعطاء دواء نيسٽالوكال لأشخاص آخرين. قوموا بإحاطة طبيبك بالمعالج أو الصيدلي أو بائع العقاقير الطبية الذي تتعاملون معه بالأمراض الأخرى التي تتعاون منها والأدوية

الأخرى التي تستعملونها (بما فيها تلك الأدوية التي قمتم بتم بشرائها بدافع ذاتي بدون استشارة طبيب)، سواء أكانت أدوية تتناولونها بالضم أو لأغراض الاستخدام الخارجي.

هل يجوز استعمال دواء نيسٽالوكال أثناء فترات الحمل والإرضاع؟

يجب أن يقرر الطبيب ما إذا كان يجوز استعمال دواء نيسٽالوكال أثناء فترات الحمل والإرضاع.

كيف يجري استعمال دواء نيسٽالوكال؟

إذا لم يقرر الطبيب خلاف هذا، فيتعين عليكم القيم بدهان كريم نيسٽالوكال مرتين (٢) أو ثلاث (٣) مرات بطبقة رقيقة على المنطقة المحددة. لا تقوموا من تلقاء أنفسكم بتغيير الجرعة الموصوفة. إذا كنتم تعتقدون أن هذا الدواء أضعف أو أشد مما يجب، فيتعين عليكم القيام بإحاطة طبيبك بالمعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه بذلك.

ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن تترتب على استعمال دواء نيسٽالوكال؟

يمكن أن تظهر بعض الآثار الموضعية غير المرغوبة مثل الإثارة بالجلد أو التهيج بالبشرة أو حدوث حرقان أو أكلان أو ميل للحك أو الحوش أو جفاف البشرة أو أي رد من ردود الأفعال أو الاستجابات للحساسية المفرطة.

كما يمكن أن يظهر بعض التفرق بالمناطق الجلدية المعالجة بهذا الدواء لمدة طويلة أو قد تتسع الأوعية الدموية السطحية الصغيرة بها وتكون بتلك المناطق الجلدية لشُرطة زرقاء ذات أحمرار.

بالنسبة لعلاج الأطفال، خاصة الصغار منهم والرُضع على الأخص، تجب مراعاة إمكانية وصول المواد الفعالة لهذا الدواء إلى مجرى الدم بطريقة متزايدة على نحو يترتب عليه حدوث اضطرابات أخرى من جراء استعمال الدواء لمدة طويلة.

ماذا يجب مراعاته أيضاً؟

يجب مراعاة حفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال في مكان لا تزيد درجة حرارته عن ٢٥ درجة مئوية. كما يُراعى عدم استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهائه المبين على عبوته. من أجل الحصول على أي استفسارات أو معلومات إضافية اتصلوا بطبيبكم المعالج أو الصيدلي أو بائع العقاقير الطبية الذي تتعاملون معه. فهؤلاء الأخصائيون لديهم المعلومات التخصصية التفصيلية.

ماذا يحتوي عليه دواء نيسٽالوكال؟

يحتوي كل غرام واحد (١) من دهان (كريم) دواء نيسٽالوكال على ما يلي:

مواد فعالة: ١٠٠٠٠٠٠ وحدة دولية من النستاتين، ١٠٠ مليغرام من النيكساميتاسون، ١١,٥ مليغرام من هيدروكلوريد هيكسيندين الكلور.

السواغات: ثنائي صوديوم الإيدينات، مأكرو غول ٤٠٠٠، وماكرو غول ٤٠٠.

أين يمكن الحصول على دواء نيسٽالوكال وبأي عيوات؟

بكمكم الحصول عليه في عيوته الأسبوعية ٦٠ غراماً بالصيدليات، بناء على وصفة طبيب. فقط.

الشركة المصنعة:

جلاروفارم شركة مساهمة، إم ساندي ٨٧٥٦٢، ميلنودي، سويسرا

مالك المنتج:

medinova

ميدنوفارم شركة مساهمة، إيجبول شتراسة ٢٨، ٨٠٥٠٠ زيوريخ، سويسرا

تمت مراجعة هذه النشرة المرفقة مع العبوة آخر مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠١٧ م

985782 / 0765364.46.2

