



(Diclofénac sel de diéthylamine)

Propriétés Pharmacologiques

Voldic® emulgel (diclofénac sel de diéthylamine) est un anti-inflammatoire non stéroïdien ayant une activité antalgique et anti-rhumatisante prononcée.

Appliqué localement en cas de rhumatismes inflammatoires ou de traumatismes, **Voldic® emulgel** soulage les douleurs et donne un effet apaisant et calmant.

Indications

Voldic® emulgel est usuellement indiqué dans les cas suivants:

- Rhumatismes localisés des tissus mous: syndrome scapulo-huméral, brusites, tendinites, et périarthroses.
- Maladies rhumatismales localisées: l'ostéoarthrose et les douleurs du dos.
- Œdèmes post-traumatiques à cause d'une entorse, d'un froissement ou d'une contusion d'un muscle, un ligament ou d'une articulation.

Posologie et administration

Dose usuelle des adultes:

Voldic® emulgel est appliqué 3-4 fois par jour sur la région affecté avec un massage doux. La quantité appliquée est fonction de la grandeur de la région à traiter, alors que la durée du traitement est fonction de la sévérité du cas et de la réaction du patient.

Voldic® emulgel peut être utiliser avec les autres formes pharmaceutiques de **Voldic®**

Dose usuelle des enfants:

L'utilisation chez l'enfant n'est pas préférée car la dose recommandée n'a pas été établie.

Grossesse et allaitement

L'innocuité de l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie.

Contre-indications

Hypersensibilité au diclofénac ou aux autres AINS, à l'acide acétylsalicylique, au propylène glycol ou à l'alcool isopropylique.

Précautions

- Diclofénac sel de diéthylamine doit être appliqué seulement sur la peau intacte et pas sur une peau lésée quelle que soit la lésion.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

Effets Secondaires

Voldic[®] emulgel est en général bien toléré. Des symptômes de dermatite de genre allergique ou non-allergique peuvent se provoquer comme de démangeaisons, des érythèmes, des œdèmes, du rash, des papules, des vésicules et une peau écaillée. Des photosensibilités ont été rapportées.

Des réactions systémiques ne sont pas susceptibles de survenir avec **Voldic[®] emulgel** que si appliqué sur une grande surface de peau traitée et pendant une période prolongée.

Surdosage

En cas de surdosage accidentel surtout chez les enfants les mesures usuelles pour le traitement d'un surdosage aux AINS doivent être instituées.

Présentation

Voldic[®] emulgel: 1 g d'emulgel contient du diclofénac sel de diéthylamine équivalent à 10 mg de diclofénac sel de sodium.

(Tube de 30 g).

(Ceci est un médicament-maintenir hors de la portée des enfants)

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin, et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- Ne le reprenez pas sans l'avis de votre médecin.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.