

# DRIPTANE®

OXYBUTYNE (CHLORHYDRATE)

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

### DÉNOMINATION

DRIPTANE®, comprimé sécable

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorhydrate d'oxybutyne (D.C.I.) ..... 5,00 mg  
Quantité correspondante d'oxybutyne base ..... 4,54 mg  
Excipients : cellulose microcristalline, stéarate de calcium, lactose anhydre pour un comprimé de 178 mg.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable.

### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Système génito-urinaire, anticholinergique.

### NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires FOURNIER S.A.

9, rue Petitot - 21000 DIJON - FRANCE

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un traitement de l'incontinence urinaire : Impériosité urinaire chez la femme, énurésie chez l'enfant et troubles de la miction rencontrés dans certaines lésions de la moelle épinière.

## ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- glaucome oculaire,
- dysurie avec adénome prostatique,
- myasthénie grave,
- bronchite chronique,
- atonie intestinale,
- difficulté à émettre les urines,
- enfants de moins de 5 ans,
- énurésie nocturne isolée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDES SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En raison de ses propriétés pharmacologiques, ce médicament peut entraîner des effets indésirables en particulier chez l'enfant, dont la sévérité peut justifier l'arrêt du traitement ou une adaptation posologique s'il doit être poursuivi. EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. Tenir hors de portée des enfants.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

### POSOLOGIE, FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Adultes : En moyenne 3 comprimés par jour, à répartir dans la journée.

Enfants de plus de 5 ans : En moyenne 2 comprimés par jour, en 2 prises régulièrement espacées.

DANS TOUS LES CAS, CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale, l'instauration progressive de la posologie est préconisée.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, en particulier : sécheresse de la bouche, troubles de la vision et de l'audition, mydriase, ralentissement du transit intestinal, agitation, cauchemars, palpitations.

SIGNEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament est à conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

## CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

CE MÉDICAMENT NE POURRA VOUS ÊTRE DÉLIVRÉ QUE SUR PRÉSENTATION D'UNE ORDONNANCE (TAB. C).

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS,
- NE PAS LE RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL,
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

## PRÉSENTATION

Boîte de 60 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/alu).

651100A



# DRIPTANE®

OXYBUTYRINE (CHLORHYDRATE)

REGULATEUR DU RYTHME MICTIONNEL

**DRIPTANE** oxybutynine (chlorhydrate). **DENOMINATION** : DRIPTANE 5 mg, comprimé sécable. **COMPOSITION** : Chlorhydrate d'oxybutynine 5,00 mg - Quantité correspondante d'oxybutynine base 4,54 mg. Excipient : cellulose microcristalline, stéarate de calcium, lactose anhydre pour un comprimé sécable de 178 mg. **FORME PHARMACEUTIQUE** : Comprimé sécable. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications thérapeutiques** : - Impériosité urinaire chez la femme, avec ou sans fuite, exclusivement en cas de vessie instable à l'exclusion des incontinences d'effort. - Enurésie, exclusivement lorsque le contexte clinique témoigne d'une immaturité vésicale (présence de troubles urinaires diurnes). - Vessies neurogènes spastiques. **Posologie et mode d'administration** : Adultes : 3 comprimés par jour, à répartir dans la journée. Enfants de plus de 5 ans : 2 comprimés par jour en 2 prises régulièrement espacées. Coût du traitement journalier : - adulte : 2,415 F. - enfant : 1,61 F. **Contre-indications** : - glaucome, - syndrome dysurique en général et adénome prostatique en particulier, - myasthénie grave, - bronchite chronique, - atonie intestinale. **Effets indésirables** : Certains effets indésirables peuvent être observés, tels que sécheresse de la muqueuse buccale, troubles de la vision, ralentissement du transit intestinal n'entraînant pas nécessairement l'arrêt du traitement. **Surdosage** : En cas de surdosage, peuvent apparaître : - une intensification des effets indésirables, - des signes d'intoxication atropinique (mydriase, forte diminution des sécrétions, paralysie des fibres lisses), à traiter par lavage d'estomac, vomitif, respiration artificielle en cas de troubles respiratoires. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES** : **Propriétés pharmacodynamiques** : L'oxybutynine est un antispasmodique de type anticholinergique. Il diminue la contractilité du détrusor et ainsi diminue l'amplitude et la fréquence des contractions vésicales ainsi que la pression intravésicale. **Propriétés pharmacocinétiques** : La concentration sérique maximale est atteinte en 30 minutes environ. Les taux plasmatiques sont proportionnels à la dose administrée. La demi-vie d'élimination plasmatique est inférieure à 2 heures. **DONNEES PHARMACEUTIQUES** : **Durée de conservation** : 3 ans. **Nature et contenance du récipient** : Plaquette thermoformée (PVC/Aluminium). **PRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE** : 60 comprimés sous plaquette thermoformée 336 956-2 [Janvier 1994]. **CONDITION DE DELIVRANCE** : Liste II. **Prix** : 48,30 F remboursé Sécurité Sociale à 35 %. **Agrément aux collectivités**. Laboratoires DEBAT - 153, Rue de Buzenval - 92380 GARCHES - Tél : 47-10-88-00.

LABORATOIRES  
**DEBAT**

**F**  
— GROUPE —  
FOURNIER

TORRENT 94.297