

Topizone®

(Acide Fusidique + Bé:améthasone Valérate)

Propriétés pharmacologiques

Topizone® est une combinaison d'acide fusidique antibactérien puissant à usage locale avec un effet anti-inflammatoire et antiprurigineux de bétaméthasone. Bétaméthasone valérate est un stéroïde à usage locale avec un effet rapide en cas de dermatoses inflammatoires.

Topizone® usage locale, l'acide fusidique est efficace contre: staphylocoques, corynebacterium, Neisseria, et certain Clostridium et Bacteroides.

Indications

Topizone® est indiqué en cas de dermatoses inflammatoires, quand les infections bactériennes sont présent ou peuvent survenir, incluant:

- Eczema Atrope
- Eczema discoïde
- Eczema de stase
- Demite séborrhéique
- Eczema de contact
- Névrodermite circonscrite
- Psonasis
- Lupus érythémateux

Posologie et administration

2-3 Fois par jour pour les les lésions découvertes pendant que une application moins fréquente peut être adéquate pour les lésions couvertes.

Usage pendant la Grossesse

Stéroïdes à usage locale ne doit pas être administré très répandue pendant la grossesse.

Contre indications

Dû à présence dû corticostéroïde, **Topizone®** est contre indiqué dans les cas suivants:

- Infections virales, tuberculeuses et fongiques de la peau
- Acné rosacée
- Eczéma périoral
- Conditions ulcérvatrices

Effets indésirables

- Comme d'autres corticostéroïds à usage locale, le traitement prolongé et intensif peut causer des changements atrophiques locaux de la peau. Tels que Stnes, amincissement, et dilatation des vaisseaux afférents superficiels particulièrement quand un pansement occlusif est appliquéd.
- En cas de l'usage très répandue ou prolongée, une absorption systemique qui peut provoquer hypercorticisme/ suppression surrénale et peuvent survenir, spécialement quand est appliquée sous occlusion/couche.

Précautions

La prudence doit être exercée en cas d'utiliser un stéroïde à usage locale près de la région des yeux, il ya une risque de Glucoma qui peut survenir quand la préparation entre dans les yeux.

Présentation

Topizone® crème de 2%: Acide fusidique de 20mg. Bétaméthasone valérate de 1mg/g.
(Tube Contient 15g).

(Ceci est un médicament - Garder les médicaments hors de la portée des enfants.)

- Le médicament est un produit qui peut sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et la mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les meilleures personnes à connaître le médicament, ses avantages et ses risques.
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne répéter pas le médicament sans l'aide de votre médecin.