

## أومنيسيف® (سفدنير)

المفعول

أومنيسيف المطور في مختبرات الابحاث في شركة أستلس هو مضاد حيوي نصف مخلق واسع الطيف، يعطي عن طريق الفم. يمتلك أومنيسيف فاعليته القاتلة للبكتيريا عن طريق تثبيطه لعملية تخلق جدار الخلية. أومنيسيف ذو ثباتية عالية تجاه البيتا-لاكتامين، ولذا فإن العديد من البكتيريا المقاومة للبنسلينات وبعض السيفالوسبيورينات كنتيجة لافراز البيتا-لاكتامين، تكون حساسة لأومنيسيف.

دوعي الاستعمال

لقد أظهرت الدراسات أن لأومنيسيف فاعليه ضد معظم سلالات البكتيريا موجبة وسالية الفرام: فصائل ستافلوكوكس، ستريلوكوكس نيمونينا، ستريلوكوكس بيوجينيز، ستريلوكوكس أجلاكتيما وستريتوكوكس فيريريدانز، هيموفيليس انفلونزا، هيموفيليس بارا إنفلونزا، موراكسيلا كاتاراليس، نيسيريا جونوريا ومنجيتيس، إشريشيتسا كولي، كليسيلاء نيمونينا، بروتيس ميرابيليس، سيروباكتر دايرس.

• التهاب اللوزتين والبلعوم، التهاب الرئة، التهاب القصبات التنفسية الحاد الناتج عن بكتيريا والاشتداد الحاد لالتهاب القصبات التنفسية المزمن، الالتهاب الحاد للأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية الفكية، والتهابات الجلد وبنية الجلد غير العقدة، والتهابات المجرى البولي.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الكبار

الجرعة الموصى بها هي: ٦٠٠ ملغم أومنيسيف يوميا. يمكن أن تعطي هذه الجرعة بأخذ كبسولة ملغم كل ١٢ ساعة أو كبسولتين ٣٠٠ ملغم مرة كل ٢٤ ساعة. يجب أن يعطى أومنيسيف كل ١٢ ساعة في حالات التهاب الرئة والجلد.

الأطفال

الجرعة الموصى بها هي ٧ ملغم/كغم ملعق كل ١٢ ساعة أو ١٤ ملغم/كغم ملعق مرة واحدة في اليوم على ألا تتعذر ٦٠٠ ملغم في اليوم.

يجب أن يعطي ملعق أومنيسيف مرتين في اليوم في حالات التهاب الجلد عند الأطفال.

٩

وزن المريض (كم) الجرعة من ملقم ١٢٥ ملغم / ٥ ملليتر\* (ملعقة صغيرة) ٥ ملليتر (ملعقة صغيرة) مرة في اليوم.

١٨

٥ ملليتر (ملعقة صغيرة) كل ١٢ ساعة أو ١٠ ملليتر (ملعقتين صغيرتين) مرة في اليوم.

٢٧

٥٧ ملليتر (٥ ملعقه صغيرة) كل ١٢ ساعة أو ١٥ ملليتر (٣ ملاعق صغيرة) مرة في اليوم.

\* بعد تحضير الملعق

الاطفال الذين يزنون أكثر من ٤٣ كغم يجب أن يعطوا الجرعة القصوى اليومية ٦٠٠ ملغم.

القصور الكلوي: يطرح سفنير من الجسم عن طريق الكلى.

الكبار

عندما تكون تصفية الكرياتين أقل من ٣٠ ملليتر/دقيقة، تكون الجرعة ٣٠٠ ملغم أومنيسيف مرة واحدة يوميا.

الأطفال

الاطفال الذين تكون تصفية الكرياتين عندهم أقل من ٣٠ ملليتر/دقيقة/١٧٣ م، يجب أن يعطوا ٧ ملغم/كغم أومنيسيف (حتى ٣٠٠ ملغم) تعطى مرة يوميا.

في المرضى الذين يخضعون لعملية غسيل الدم تكون الجرعة ٣٠٠ ملغم أو ٧ ملغم/كغم يوما بعد يوم.

مضادات الاستعمال

لا يستعمل سفنير لدى المرضى الذين لديهم حساسية معروفة للمضادات الحيوية من مجموعة السيفالوسبيورينات.

المحاذير

قبل البدء بالمعالجة يجبأخذ الحيوطة لتحديد ما إذا كان المريض قد تعرض من قبل لتفاعلات حساسية مفرطة تجاه السيفالوسبيورينات أو البنسلينات.

### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإسهاماته خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.



بتاريخ من:  
شركة أستلس أوساكا - اليابان  
انتاج: شركة الجزيرة للصناعات الدوائية.  
الرياض - المملكة العربية السعودية  
شركة أدوية الحكمة، عمان - الأردن

# hikma.