

معلوكس® تي سي

A02AD01

هيدروكسيد المغنيسيوم

و هيدروكسيد الألومنيوم جيل جاف

محلول ملعق

أقراص للمضغ

التركيز:

تحتوي كل 100 جرام من المحلول المعلق على ما يلي:

عناصر فعالة:

هيدروكسيد المغنيسيوم 6,00 جرام

هيدروكسيد الألومنيوم 12,00 جرام

السواغ:

متيل باراهيدروكسبيزوات، بروبيل باراهيدروكسبيزوات، صمغ جوار ، سوربيتول محلول بنسبة 70%، حمض ليمونيك، خلاصة العناء، ماء مكررة.

كل قرص يحتوي على:

عناصر فعالة:

هيدروكسيد المغنيسيوم 300 ملجرام

هيدروكسيد الألومنيوم جيل جاف 600 ملجرام

السواغ:

مانitol، حبيبات المانيتول، سكرزوز، سوربيتول محلول بنسبة 70%， غليسيرين، زيت الفازلين، نكهة القشدة السويسرية، خلاصة العناء، نكهة الحامض، ستارات المغنيسيوم، طلق.

التعليم:

محلول ملعق يؤخذ بالفم:

- علبة فيها 15 ملليلتر من المحلول المعلق الواحد

- قارورة فيها 200 ملليلتر من المحلول المعلق

أقراص تؤخذ بالفم:

- علبة فيها 40 قرص للعلق

الفئة الطبية العلاجية:

المعلوكس® تي سي هو مستحضر ذو تركيز عالي لهيدروكسيد المغنيسيوم ولهيدروكسيد الألومنيوم. وهو ذو مفعول مرتتفع لمعالجة الحمضة والقرحة.

صاحب الترخيص التجاري:

شركة أفتنت فارما المساهمة (AVENTIS PHARMA SpA)

5 ميدان س. تور - 20149 ميلانو (إيطاليا)

المصنوع:

شركة أفتنت فارما المساهمة

11 جادة أوروبا - 21040 أوريجيرو (محافظة فاريزه) - إيطاليا

التعليمات:

يُستعمل لتقديم التزف على مستوى المعدة الإثنى عشرية الناتج عن الإرهاق. كما يُستعمل كمضاد للحموضة لمعالجة عوارض الحرقة في فم المعدة الناشئة عن سوء الهضم والألام الشرسوفية التي ترافقها القرحة الهضمية أو أمراض أخرى معدية إمعانية التي تحتاج لقدرة معادلة عالية.

تضاد الإستطباب:

بالإمكان تناول المستحضر في حالات العجز الكلوي فقط تحت إشراف الطبيب.

تحذير:

ينبغي عدم تناول أكثر من 3 ملعقات/3 مطاريف (45 ملليلتر) من المحلول المعلق أو أكثر من 9 أقراص في الأربع وعشرين ساعة أو هذه الجرعة لأكثر من أسبوعين متتاليين أو إستعمال المستحضر في حال مرض الكلية من دون موافقة الطبيب.

التفاعل مع أدوية أخرى:

إن من شأن معلوكس® تي سي الحد من إمتصاص بعض المضادات الحيوية المصنوعة من النيتراسيكلين أو أدوية أخرى (فينتيبيدين، ديجوسين، إنديوميتاسين، فوروسبيدي، أيزونيازيد، مضادات الكولييرجية). من المستحسن وبالتالي تناول معلوكس® تي سي قبل أو بعد هذه الأدوية بساعتين إثنتين.

الإستعمال أثناء الحمل والرضاعة:

بالرغم من عدم العلم بحدوث ردات فعل معاكسة في حال الحمل أو الرضاعة إلا أنه من المستحسن الإقتصار على استعماله بناء على وصفة من الطبيب، مثلاً بذلك مثل كافة الأدوية الأخرى.

تحذير:

ابقوا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

الجرعات وطريقة ومدة استعمال هذا الدواء:

- لتجنب التزف على مستوى المعدة الإثنى عشرية العليا الناتج عن الإرهاق

حدّدوا درجة حموضة (pH) المخصوص المعدي. وادخلوا وبالتالي بواسطة مسبار نحو 10 ملليلتر من محلول معلوكس® تي سي المعلق مع نحو 30 ملليلتر من الماء. تأكّدوا كل ساعة، عن طريق السقط إذا كانت حموضة المحتوى المعدي تساوي أو تزيد على 4. في حال قل المحتوى المعدي عن 4 أو أخلوا كمية مضاعفة من معلوكس® تي سي لكي مع 30 ملليلتر من الماء إلى أن تصلوا على درجة حموضة تزيد أو تعادل 4.

- العلاج العرضي

15 ملليلتر، أي ملعقة واحدة أو مظروف واحد من المحلول المعلق أو ثلاثة أقراص مضبوطة أو مخصوصة جيداً، بعد وجبات الطعام بساعة أو قبل الرقوض، أو بحسب ما ينصح به الطبيب. لمعالجة القرحة الهضمية بالإمكان اعتماد جر عات أقوى شريطة أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر للطبيب.

خضوا المحلول المعلق جيداً قبل الإستعمال.

ينبغي مضغ أو مضغ الأقراص جيداً.

الجرعات القوية جداً:

في حال تناولتم بشكل عرضي جرعة قوية جداً راجعوا الطبيب لإعتماد العلاج المناسب.

الأثار غير المرغوبية:

أن معلوكس® تي سي بتركيبته يميل إلى عدم تعديل تصرف البطن. ومع ذلك وعند بعض الأشخاص وفي حال كانت الجرعة عالية قد يحصل تسارع في تفريغ الإمعاء. كما بالإمكان إحداث تقوءة من حين لآخر حتى وإن جاء تناوله وفق الجرعات المنصوص بها لتفادي تزف القسم المعدي الإثنى عشرى الناتج عن الإرهاق.

في حال بروز أثار غير مرغوبة مختلفة عن تلك المنصوص عنها هنا اخترووا طبيكم المعالج

تحذير: لا تستعملوا الدواء بعد تاريخ إنتهاء فعاليته المدون على العلبة.

طريقة الحفظ:

الأقراص: تحفظ تحت درجة ثلاثة منوية.

المحلول المعلق: ابقوا الدواء تحت درجة حرارة لا تقل عن أربع درجات منوية.

ابقوا على القارورة محكمة الإغلاق.

تاريخ آخر مراجعة: يوليو 2001م.