

معلوكس® تي سي
A02AD01
هيدروكسيد المغنيسيوم
وهيدروكسيد الألومنيوم جيل جاف
محلول معلق
أقراص للمضغ

التركيب:

تحتوي كل 100 جرام من المحلول المعلق على ما يلي:

عناصر فعالة:

| | |
|----------------------|------------|
| هيدروكسيد المغنيسيوم | 6,00 جرام |
| هيدروكسيد الألومنيوم | 12,00 جرام |

السواغ:

ميتيل باراهيدروكسينزوات، بروبيل باراهيدروكسينزوات، صمغ جوار ، سوربيتول محلول بنسبة 70%، حمض ليمونيك، خلاصة النعناع، ماء مكررة.

كل قرص يحتوي على:

عناصر فعالة:

| | |
|------------------------------|------------|
| هيدروكسيد المغنيسيوم | 300 ملجرام |
| هيدروكسيد الألومنيوم جيل جاف | 600 ملجرام |

السواغ:

مانيتول، حبيبات المانيتول، سكروز، سوربيتول محلول بنسبة 70%، غليسرين، زيت الفازلين، نكهة القشدة السويسرية، خلاصة النعناع، نكهة الحامض، ستيرات المغنيزيوم، طلق.

التعليب:

محلول معلق يؤخذ بالفم:

- علبة فيها 15 مطروف سعة 15 مليلتر من المحلول المعلق الواحد

- قارورة فيها 200 مليلتر من المحلول المعلق

أقراص تؤخذ بالفم:

- علبة فيها 40 قرص للعلق

الفئة الطبية العلاجية:

المعلوكس® تي سي هو مستحضر ذو تركيز عالي لهيدروكسيد المغنيزيوم ولهيدروكسيد الألومنيوم. وهو ذو مفعول مرتفع لمعالجة الحموضة والقرحة.

صاحب الترخيص التجاري:

شركة أفنتس فارما المساهمة (AVENTIS PHARMA SpA)

5 ميدان س. تور - 20149 ميلانو (إيطاليا)

المصنع:

شركة أفنتس فارما المساهمة

11 جادة أوروبا - 21040 أوريجو (محافظة فاريزه) - إيطاليا

التعليمات:

يُستعمل لتفادي النزف على مستوى المعدة الإثني عشرية الناتج عن الإرهاق. كما يُستعمل كمضاد للحموضة لمعالجة عوارض الحرقة في فم المعدة الناشئة عن سوء الهضم والالام الشرسوفية التي ترافقها القرحة الهضمية أو أمراض أخرى معدية إمعانية التي تحتاج لقدرة معادلة عالية.

تضاد الإستطباق:

بالإمكان تناول المستحضر في حالات العجز الكلوي فقط تحت إشراف الطبيب.

تحذير:

ينبغي عدم تناول أكثر من 3 ملعقات/3 مطاريف (45 مليلتر) من المحلول المعلق أو أكثر من 9 أقراص في الأربع وعشرين ساعة أو هذه الجرعة لأكثر من اسبوعين متتاليين أو إستعمال المستحضر في حال مرض الكلية من دون موافقة الطبيب. التفاعل مع أدوية أخرى:

إن من شأن معلوكس® تي سي الحد من إمتصاص بعض المضادات الحيوية المصنوعة من النيتراسيكلين أو أدوية أخرى (فنتوتين، ديجوسين، إندوميثاسين، فوروسميد، ايزونيازيد، مضادات الكوليرجية). من المستحسن بالتالي تناول معلوكس® تي سي قبل أو بعد هذه الأدوية بساعتين إثنين. الإستعمال أثناء الحمل والرضاعة؟:

بالرغم من عدم العلم بحدوث ردات فعل معاكسة في حال الحمل أو الرضاعة إلا أنه من المستحسن الإقتصار على استعماله بناء على وصفة من الطبيب، مثله بذلك مثل كافة الأدوية الأخرى.

تحذير:

أبقوا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

الجرعات وطريقة ومدة استعمال هذا الدواء:

- لتجنب النزف على مستوى المعدة الإثني عشرية العليا الناتج عن الإرهاق

حدّوا درجة حموضة (pH) الممصوص المعدي. وادخلوا بالتالي بواسطة مسبار نحو 10 مليلتر من محلول معلوكس® تي سي المعلق مع نحو 30 مليلتر من الماء. تأكدوا كل ساعة، عن طريق السطف إذا كانت حموضة المحتوي المعدي تساوي أو تزيد على 4. في حال قلّ المحتوي المعدي عن 4 أو أدخلوا كمية مضاعفة من معلوكس® تي سي لكي مع 30 مليلتر من الماء الى أن تحصلوا على درجة حموضة تزيد أو تعادل 4.

- العلاج العرضي

15 مليلتر، أي ملعقة واحدة أو مطروف واحد من المحلول المعلق أو ثلاثة أقراص ممضوغة أو ممصوصة جيداً، بعد وجبات الطعام بساعة أو قبل الرقوض، أو بحسب ما ينصح به الطبيب. لمعالجة القرحة الهضمية بالإمكان إعتقاد جرعات أقوى شريطة أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر للطبيب.

خضوا المحلول المعلق جيداً قبل الإستعمال.

ينبغي مضغ أو مص الأقراص جيداً.

الجرعات القوية جداً:

في حال تناولتم بشكل عرضي جرعة قوية جداً راجعوا الطبيب لإعتقاد العلاج المناسب.

الأثار غير المرغوبة:

أن معلوكس® تي سي بتركيبته يميل الى عدم تعديل تصرّف البطن. ومع ذلك وعند بعض الأشخاص وفي حال كانت الجرعة عالية قد يحصل تسارع في تفرغ الإمعاء. كما بالإمكان إحداث تقيؤ من حين لآخر حتى وإن جاء تناوله وفق الجرعات المنصوح بها لتفادي نزف القسم المعدي الإثني عشرية الناتج عن الإرهاق.

في حال بروز آثار غير مرغوبة مختلفة عن تلك المنصوص عنها هنا أخطروا طبيكم المعالج.

تحذير: لا تستعملوا الدواء بعد تاريخ إنقضاء فعاليته المدون على العلبة.

طريقة الحفظ:

الأقراص: تحفظ تحت درجة ثلاثين مئوية.

المحلول المعلق: ابقوا الدواء تحت درجة حرارة لا تقل عن أربع درجات مئوية.

أبقوا على القارورة محكمة الإقفال.

تاريخ آخر مراجعة: يوليو 2001م.