

Dicynone® 500

Antihémorragique

Composition

Principe actif: étamyslate
Étamyslate 500 mg. Antiox. (E 221), excipients pro 1 comprimé.

Propriétés/Effets

L'étamyslate est un antihémorragique et un angioprotecteur de synthèse qui agit sur le premier temps de l'hémostase (interaction endothélio-plaquettaire). En améliorant l'adhésivité plaquettaire et en restaurant la résistance capillaire, il est capable de réduire le temps de saignement et la quantité des pertes sanguines.

L'étamyslate ne possède pas d'effet vasoconstricteur, n'influence pas la fibrinolyse et ne modifie pas les facteurs plasmatiques de la coagulation.

Pharmacocinétique

L'étamyslate administré par voie orale est lentement résorbé au niveau du tractus gastro-intestinal. Après administration de 500 mg d'étamyslate, on observe un maximum du taux sanguin après 4 heures à environ 15 µg/ml, mais la biodisponibilité n'est pas connue. Le taux de liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 95%. La demi-vie plasmatique est en moyenne de 3,7 heures. Environ 72% de la dose administrée oralement sont éliminés par voie urinaire dans les premières 24 heures ; la molécule est excrétée sous forme inchangée.

L'étamyslate passe la barrière placentaire. Les taux dans le sang maternel et dans le sang du cordon ombilical sont similaires. On ignore si l'étamyslate est excrété dans le lait maternel.

Cinétique dans des situations cliniques particulières

On ignore si les propriétés pharmacocinétiques de l'étamyslate sont modifiées chez des patients atteints de troubles des fonctions rénales et/ou hépatiques.

Indications/Possibilités d'emploi

En chirurgie:

Prophylaxie et traitement des hémorragies capillaires, pré- et postopératoires dans toutes les interventions délicates ou sur tissus richement vascularisés : O.R.L., gynécologie, obstétrique, urologie, odontostomatologie, ophtalmologie, chirurgie plastique et réparatrice.

En médecine interne:

Prophylaxie et traitement des hémorragies capillaires, quelles que soient leur origine et leur localisation: hématurie, hématurie et méléna, épistaxis, gingivorragie.

En gynécologie:

Métrorragie, ménorragie primaire ou due aux dispositifs intra-utérins, en l'absence d'une pathologie organique.

Posologie/Mode d'emploi

Adultes

En préopératoire: 1 comprimé (500 mg) 1 heure avant l'intervention.

En postopératoire: 1 comprimé (500 mg) à répéter toutes les 4-6 heures usuellement longtemps que persiste le risque hémorragique.

En médecine interne: en général 1 comprimé 2 ou 3 fois par jour (1000-1500 mg) à prendre aux repas avec un peu d'eau ; la durée du traitement dépendra des résultats obtenus.

En gynécologie, dans les méno-métrorragies: 1 comprimé 3 fois par jour (1500 mg) à prendre aux repas avec un peu d'eau. Le traitement dure 10 jours et débute 5 jours avant la date d'apparition prévue des règles.

Enfants

En raison de sa teneur élevée en principe actif, Dicynone 500 est inapproprié pour le traitement de l'enfant.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Porphyrie aigüe.

Précautions

L'administration parentérale de Dicynone peut provoquer des chutes de la tension artérielle, mais il n'y a aucune donnée au sujet de ce risque lors d'une administration orale.

Si Dicynone 500 est administré pour atténuer des hémorragies menstruelles trop abondantes et/ou trop longues sans que le traitement soit suivi d'une amélioration, d'éventuelles causes pathologiques doivent être recherchées et exclues.

Grossesse/Allaitement

Catégorie de grossesse C : des études chez la femme enceinte ou chez l'animal ne sont pas disponibles. Par précaution, Dicynone 500 ne devrait pas être employé pendant le 1^{er} trimestre de la grossesse, tandis que pendant les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres elle ne devrait être employée que si le bénéfice thérapeutique escompté est jugé supérieur au risque potentiel pour le fœtus.

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement ou, en cas de poursuite de l'allaitement, le traitement doit être arrêté.

Effets indésirables

Rares: gastralgie, nausées, céphalées, rash cutané.

Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent spontanément.

Dans les cas rebelles, la posologie devrait être réduite ou le traitement arrêté.

Interactions

Aucune interaction n'est connue à ce jour.

Surdosage

On ne connaît pas les manifestations d'un surdosage. En cas de surdosage éventuel, instaurer un traitement symptomatique.

Remarques particulières

Conservation

Dicynone 500 ne doit pas être utilisée au-delà de la date indiquée sur l'emballage par "EXP".

Présentations

Comprimés: 20 et 60.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui affecte la santé et sa consommation contraire aux instructions est dangereux pour vous. Suivez strictement la prescription de votre médecin, la méthode à utiliser et les instructions du pharmacien qui vous délivre le médicament.
- Votre médecin et votre pharmacien sont experts en médicaments et en maîtrisent les bienfaits et les risques.
- N'interrompez pas de vous-même la durée de traitement prescrite par votre médecin.
- Ne recommencez pas un nouveau traitement sans consulter votre médecin.

**Conserver le médicament
hors de portée des enfants**

Distributeur

OM PHARMA, Meyrin - Genève Suisse.

Mise à jour de l'information: 2003