

أبتوتيل® تحاميل مهبلية

للإدخال في المهبل

بوليكرسيولين

التركيب

تحتوي كل تحاميل مهبلية على:

المادة الفعالة

بوليكرسيولين ٩٠ ملجم

الأسوجة

ماكروجول ١٥٠٠ و ٤٠٠٠، ماء

السوائل

ماكروجول ١٥٠٠ و ٤٠٠٠، ماء

الشكال الصيدلاني والمحتوى

تحاميل مهبلية

uboatibol مهبلية

عبوات بها ٦ تحاميل مهبلية

الدواء / الفئة الاستطبابية / آلية التأثير

مستحضر مطهر / يستعمل في معالجة الأمراض

الشركة المالكة لحق التسويق

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2

78467 Konstanz

Germany

الشركة المصنعة

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8

78224 Singen

Germany

دوعي الاستعمال

العلاج الموضعي للالتهابات العنقية المهبلية أو العدوى والتلف النسيجي (مثل الإخراج أو السيلان المهبل والعنقي الذي تسببه البكتيريا والمشعرات والإنتانات الفطرية، فرحة الضغط عند النساء اللواتي يستعملن الحجاب)، اللقمة المؤنفة (الورم التقولي المؤنف) الخ.

العلاج في الفترات ما بين عمليات الكي، بعد المعالجة البدائية بمحلول أبتوتيل المركز.

نواهي الاستعمال

من غير المعروف وجود نواهي للإستخدام.

يجوز استعمال تحاميل أبتوتيل المهبلية خلال فترة الحمل والإرضاع إلا عند الضرورة الملحقة وبعد موافنة المخاطر جيداً الممكن حدوثها للأم والطفل، ليس من ثمة أي دراسات متوفرة فيما يتعلق بالمخاطر الممكن حدوثها

عند الإنسان، غير أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم تكشف عن حدوث أي شوهات بالجنين.

من غير المعرف فيما إذا كانت المادة الفعالة تدخل في حليب الأم.

التحذيرات والاحتياطات الخاصة عند الاستعمال

- يجب توخي الحذر بعدم بلع التحاميل، غير أنه في حال بلع تحاميل أبتوتيل المهبلية بشكل غير متعمد،

عندها يجب عليك فوراً شرب كمية وافرة من الماء واستشارة طبيبك.

- تقوم تحاميل أبتوتيل المهبلية بحث وتحريض عمليات الالتئام والشفاء بشكل قوي، وليس هناك داعي للقلق إذا تخسر النسيج النخر من المنطقة المصابة، حتى ولو كان ذلك بكميات كبيرة.

- خلال مدة العلاج يجب تفادى استعمال الصابون الذي يسبب التخريش وتتجنب الجماع.

- كما هو الحال مع جميع الأدوية المهبلية ينبغي عدم استعمال تحاميل أبتوتيل المهبلية أثناء الحيض.

- عليك حماية مينيك من تحاميل أبتوتيل المهبلية في حال دخول تحاميل أبتوتيل المهبلية إلى العينين يجب شطفها جيداً وفوراً بالماء، وقد يتطلب الأمر استشارة طبيب العيون.

- في حال ملامسة إنسوجات أو الجلد لتحاميل أبتوتيل المهبلية يجب شطفها فوراً قبل تجفيفها.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال تحاميل أبتوتيل المهبلية خلال فترة الحمل والإرضاع إلا عند الضرورة الملحقة وبعد موافنة المخاطر جيداً الممكن حدوثها للأم والطفل، ليس من ثمة أي دراسات متوفرة فيما يتعلق بالمخاطر الممكن حدوثها عند استعمال المستحضر خلال الحمل عند الإنسان، غير أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم تكشف عن حدوث أي شوهات بالجنين. من غير المعروف فيما إذا كانت المادة الفعالة تدخل في حليب الأم.

التأثيرات على قابلية القيادة أو تشغيل الماكينات والأجهزة حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإنه عند استعمال تحاميل أبتوتيل المهبلية وفقاً لما وصفه الطبيب لن يكون لها أي تأثير على قابلية السوافة أو تشغيل الماكينات.

التفاعلية مع الأدوية الأخرى

تحاميل أبتوتيل المهبلية مخصصة على وجه الحصر للإستخدام الموضعي، ينبغي تفادى استعمال أدوية موضعية أخرى على نفس المنطقة أثناء العلاج المستحضر أبتوتيل، لأنه لا يمكن استثناء حدوث التآثرات والتفاعلات مع الأدوية الأخرى.

يرجى المراعات بأن هذه المعلومات تطبق أيضاً على الأدوية التي قد تكون تعاطيتها مؤخرًا.

الجرعة وطريقة الاستعمال

تطبق المعلومات التالية مالم يصف لك الطبيب تحاميل أبتوتيل المهبلية بغير ذلك.

يرجى إتباع هذه التعليمات حيث أنه بخلاف ذلك فإن تحاميل أبتوتيل المهبلية قد لا تؤدي مفعولها بالطريقة المرغوبة والسليمة.

إرشادات الاستعمال / طريقة العالجة

بالاعتماد على شدة الحالة المرضية تستعمل تحاميل مهبلية واحدة يومياً أو كل يومين.

بعد العالجة ابتدأ باستخدام محلول أبتوتيل المركز يتم إدخال تحاميل أبتوتيل واحدة في المهبل كل يومين في الفترات الواقعة ما بين عمليات الكي.

ينبغي إدخال التحاميل المهبلية في المساء.

لتسييل عملية الإدخال يجب ترتيب التحاميل بما ويعدها يتم إدخالها بعمق في المهبل، علماً بأنه يفضل عمل ذلك وضع الاستقاء. تجنباً لتسخين الملابس والشرافت ينصح باستخدام منشفة صحية. تعتمد مدة الاستعمال على طبيعة وشدة الحالة المرضية ويتم تحديدها من قبل الطبيب.

الاستعمال الخاطئ وفترط الجرعة

ليس هناك حوادث معروفة عن فترط الجرعة.

إذا نسيت استعمال المستحضرات في المرة القادمة وإنما استمري بالعلاج بالفواصل الزمنية المحددة، وقومي بإعلام طبيبك وفقاً لذلك.

إذا رغبت بقطع العلاج يرجى إعلام طبيبك بذلك.

التأثيرات غير المرغوبة

قد يحدث تبكيج موضعي في بعض الحالات المنعزلة في بداية العلاج بتحاميل أبتوتيل المهبلية، غير أن هذه التهيجات عادة ما تختفي بسرعة.

في حال حدوث تبكيج موضعي شديد يجب عليك التوقف عن استعمال تحاميل أبتوتيل المهبلية وإعلام طبيبك بذلك.

إذا عانيت من تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة يرجى إعلام الطبيب أو الصيدلاني بذلك.

شروط التخزين والصلاحيّة

تبقي تحاميل أبتوتيل المهبلية كما هي ولا تغير مدة ٥ سنوات إذا تم حفظها بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.

إن تاريخ إنتهاء صلاحية هذه العبوة مطبوع على العبوة والعلبة.

لا تستعمل هذه العبوة بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية!

ملاحظة

في حال وجود البقع والنقط على التحاميل المهبلية فإن ذلك يعود إلى الشكل الطبيعي لأساس التحاميل وهو أمر لا يؤثر على قابلية تطبيق المستحضر أو فعاليته أو قابلية تحمله.

تاريخ آخر مراجعة للنص.

٢٠١٠ يونيو

إن هذا دواء

الدواء مستحضر ي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

إن الطبيب والصيدلاني هما الخبرتان بالدواء وبنفسه وضرره.

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.

لا تكرر صرف الدواء دون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

إتحاد الصيادلة العرب