

بنزاك ايه سي ٢.٥ ٪ جيل
بيروكسيد البنزويل

بنزاك ايه سي ٥٪ جيل
بيروكسيد البنزويل

بنزاك ايه سي ١٠ ٪ جيل
بيروكسيد البنزويل

يُرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل أن تبدأ في استخدام هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة عن مرضك أو الدواء الخاص بك، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك. لا تعطه للآخرين. فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني أنت منها.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيرًا، أو لاحظت آثارًا جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

في هذه النشرة:

١. ما هو عقار بنزاك ايه سي؟ وفيم يُستخدم؟
٢. قبل أن تستخدم عقار بنزاك ايه سي.
٣. كيفية استخدام عقار بنزاك ايه سي
٤. الآثار الجانبية المحتملة.
٥. كيفية تخزين عقار بنزاك ايه سي.
٦. معلومات إضافية

١. ما هو عقار بنزاك ايه سي؟ وفيم يُستخدم؟

- يحتوي عقار بنزاك ايه سي على مادة فعّالة تسمى بيروكسيد البنزويل والتي تهاجم البكتيريا (الجر اثيم) المعروفة باسم بروبينيوم باكثيريوم اكثيز، وهي من الأحد الأسباب الرئيسية المسببة لحب الشباب.
- يوصي طبيبك أو الصيدلي الخاص بك بهذا الدواء لعلاج حب الشباب، حب الشباب يظهر على شكل رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، والناس يشيرون عليها عادة بالبنثر.
- يمكن علاج حب الشباب الموجود في الوجه والصدر أو الظهر مع هذا الدواء.

٢. قبل أن تستخدم عقار بنزاك ايه سي.

لا تستخدم عقار بنزاك ايه سي في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) تجاه بيروكسيد البنزويل أو أي من المكونات الأخرى (المدرجة في القسم ٦).
- لا تستخدم عقار بنزاك ايه سي إذا انطبق عليك ما سبق. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر الصيدلي الخاص بك أو طبيبك قبل استخدام هذا الدواء.

توخ حذرًا خاصًا مع عقار بنزاك ايه سي.

- تواصل مع طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام عقار بنزاك ايه سي.
- تجنب ملامسة العينين، الفم، وزوايا الأنف والأسطح المخاطية الأخرى مثل بطانة الأنف. إذا حدث تلامس عرضي اشطف جيدًا بالماء الدافئ.
- لا يوضع عقار بنزاك ايه سي على المناطق المقطعة من الجلد مثل الجروح أو الخدوش.
- قد يسبب عقاربنزاك ايه سي، تورم وبثور في الجلد فإذا حدثت أي من هذه الأعراض يجب التوقف عن العلاج فورًا.
- قد يؤدي عقار بنزاك ايه سي إلى تبييض الشعر والأقمشة الملونة مثل الملابس، الأقمشة، والأثاث. توخي الحذر لمنع ملامسة الجل لهذه المواد.
- نرجوا منك التأكد من غسل يديك بعد استخدام عقار بنزاك ايه سي.
- ينبغي توخي الحذر عند استخدام عقار بنزاك ايه سي على الرقبة والمناطق الحساسة الأخرى.
- تجنب التعرض المتكرر لأشعة الشمس أو مصادر أخرى للأشعة فوق البنفسجية (على سبيل المثال ضوء السرير).

استخدام أدوية أخرى مع عقار بنزاك ايه سي.

يُرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخرًا أية أدوية أخرى. ويشمل ذلك الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية، مثل الأدوية العشبية.

بوجه خاص، أخبر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك في الحالات الآتية:

- إذا كنت تستخدم علاجا اخر لحبّ الشباب. إذا استخدمتم في الوقت نفسه، فقد يؤدي إلى تفاقم تهيجّ الجلد.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا يوجد سوى معلومات محدودة بشأن أمان عقار بنزاك ايه سي في السيدات الحوامل.

أخبري طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت حاملًا أو تنوين الحمل.

أخبري طبيبك إذا أصبحت حاملًا أثناء العلاج بعقار بنزاك ايه سي.

من غير المعروف ما إذا كانت المواد الفعّالة لعقار بنزاك ايه سي تمر إلى لبن الأم، أم لا.

إذا كنت ترضعين فجب عليك مراجعة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل استخدام عقار بنزاك ايه سي.

• لا تستخدم في عقار بنزاك ايه سي على ثديك إذا كنت ترضعين طبيعيا.

معلومات هامة عن بعض مكونات عقار بنزاك ايه سي

يحتوي عقار بنزاك ايه سي على جليكول البروبيلين. قد يسبب جليكول البروبيلين تهيجًا للجلد.

٣. كيفية استخدام عقار بنزاك ايه سي

إذا كان هذا الدواء موصوفًا من قبل طبيبك أو الصيدلي الخاص بك، فاتبع تعليماتهما. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فاتبع التعليمات الواردة أدناه. إذا لم تفهم التعليمات أو كنت غير متأكد بشأن أمر ماء، فاستشر الصيدلي الخاص بك أو طبيبك.

- اغسل المنطقة المصابة بمنظف جلدي خفيف وماء، ثم قومي بتجفيف بشرتك بلطف.
- ضع طبقة رقيقة من الجل مرة أو مرتين في اليوم على المناطق المصابة.
- إذا كان لديك بشرة حساسة، ضع الجل مرة واحدة يوميًا قبل النوم.
- أي جفاف أو تقشير يمكن أن حدوثه لبشرتك، يمكن التقليل منه إذا عدلت عدد مرات استخدام العقار مثلاً مرة واحدة في اليوم أو مرة واحدة كل يومين حتى يتكيف جلدك مع العقار.
- عليك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية حين استخدام العقار وإن كان ولا بد فعليك استخدام واقي شمس مناسب واستخدام العقار مساءً. تذكر عليك غسل المنطقة قبل الاستخدام.
- يعتمد طول فترة استخدامك عقار بنزاك ايه سي على مدى تحسن حالتك. بعد استخدام العقار لمدة شهر عليك زيارة طبيبك أو الصيدلي مرة أخرى. هو يستطيع معرفة تطور حالتك.

إذا أغلقت استخدام عقار بنزاك ايه سي.

- لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي أغلقتها.
- تجاوز الجرعة التي أغلقتها وضع الجرعة التالية في الموعد المعتاد.

إذا استخدمت كمية زائدة عن المطلوب أو ابتلعت عقار بنزاك ايه سي بطريق الخطأ.

من غير المتوقع أن تسبب مكونات عقار بنزاك ايه سي ضررًا إذا تم ابتلاعها بالكميات القليلة التي توضع عادة على الوجه. ولكن إذا وصلت إلى فمك كمية أكبر من عقار بنزاك ايه سي بطريق الخطأ، فاشطفه فورًا بكمية كبيرة من المياه.

يُرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك للمشورة.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثلّه مثل كافة الأدوية، قد يسبب عقار بنزاك ايه سي آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع:

تفاعلات حساسية شديدة:

قد تشمل العلامات ما يلي:

- طفحًا جلديًا بارزًا ومصحوبًا بحكة ارتكاريًا.
- تورم الوجه أو الفم (وذمة وعائية)، مما يسبب صعوبة في التنفس.
- هبوطا.

اتصل بطبيبك فورًا إذا أصبت بهذه الأعراض. توقف عن استخدام عقار بنزاك ايه سي فورًا.

الآثار الجانبية الشائعة جدًا:

قد تؤثر في أكثر من ١ من كل ١٠ أشخاص:

- جفاف الجلد.
- احمرار الجلد.
- تقشر الجلد.
- حرقان بالجلد.

الآثار الجانبية الشائعة:

قد تؤثر في ما يصل إلى ١ من كل ١٠ أشخاص:

- حكة الجلد.
- ألم الجلد.
- تهيج الجلد (التهاب الجلد الإلتهامسي).

الآثار الجانبية غير الشائعة:

قد تؤثر في ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠ أشخاص:

- التهاب الجلد الإلتهامسي.

هذه الأعراض قابلة للإختفاء إذا تم تقليل عدد مرات استخدام العلاج أو التوقف عن استخدامه.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أصبت بأية آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض (٥). ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة.

٥. كيفية تخزين عقار بنزاك ايه سي.

- يحفظ بعيدًا عن متناول ورؤية الأطفال.
- يجب حفظ عقار بنزاك ايه سي في درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.
- لا تستخدم عقار بنزاك ايه سي بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على الانبوب والعبوة الكرتونية.
- يجب عدم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية.
- استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التّخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. سنُساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

ما محتويات عقار بنزاك ايه سي؟

المادة الفعّالة هي بيروكسيد البنزويل. يشار إلى كمية بيروكسيد البنزويل في دوانك بالرقم الموجود بعد الاسم "بنزاك ايه سي ٢.٥ ٪" يحتوي على ٢.٥ ٪ بيروكسيد البنزويل. بنزاك ايه سي ٥ يحتوي على ٥ ٪ بيروكسيد البنزويل. بنزاك ايه سي ١٠ يحتوي على ١٠ ٪ بيروكسيد البنزويل. المكونات الأخرى هي: صوديوم دوكوسات، داي صوديوم اينثا، بولكسمر ٩٤٠، بروبيلين جلايكول، اكريلتس كوبولمر، جلايسيرول، كوليونيل انهايدروس سيليكًا، ماء نقس، صوديوم هايدروكسيد لضبطدرجة الحموضة.

ما شكل عقار بنزاك ايه سي؟

عقار بنزاك ايه سي هو عبارة عن جيل أبيض اللون ويأتي في ٦٠ جم أنبوب.

مالك حق التسويق وجهة التصنيع

مالك حق التسويق:

شركة جالديرما إنترناشيونال

تور يوروبلازا - لا ديفينس ٤

٢٠، شارع اندريه بروثن

٩٢٩٢٧ لا ديفونس سيديكس - فرنسا

المصنع:

مختبرات جالديرما

المنطقة الصناعية - موندسيبر

٧٤٥٤٠ ألي سور كران، فرنسا

للاطلاع على أي معلومات إضافية بشأن هذا المنتج الدوائي، يرجى التواصل معنا عن طريق: ME.Regulatory.AEDXB@galderma.com

- تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في (٢٠١٨/٠٦)، الإصدار رقم (٢).

لإبلاغ عن أية آثار جانبية:

* المملكة العربية السعودية:

- المركز الوطني للتحفظ والسلامة الدوائية

o فاكس: ٠٥٧٦٦٢-٢٠٥-١١-٩٦٦+

o اتصل بالمركز الوطني للتحفظ والسلامة الدوائية على الرقم: ٢٠٣٨٢٢٢-١١-٩٦٦+

o الهاتف المجاني: ٠٤٢٣٤٠-٢٣٣٤-٢٣٥٣-٢٣٥٦-٢٣١٧

o الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠

o البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

o الموقع على الانترنت: www.sfd.gov.sa/npc

* دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:

- يُرجى الاتصال بسلطات الاختصاص المعنية.

هذا منتج دوائي

-الدواء منتج يؤثر على صحتك وتناوله على نحو مخالف للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بشكل صارم وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.

- الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.

- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.

- احفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب