

CUTACNYL

peroxyde de benzoyle

Formes et présentations

Lotion à 5% et 10% : flacons de 40ml.

gel à 2,5%, 5% et 10% pour application locale : tubes de 40 g.

Composition

Lotion	p. 100 g	p. flacon
Cutacnyl 5		
peroxyde de benzoyle	5 g	1,8 g
Cutacnyl 10		
peroxyde de benzoyle	10 g	3,6 g
Excipient : alcool cétylique, propyleneglycol, laurylsulfate de sodium, hydroxyéthylcellulose, eau purifiée (86%)		
Gel		
Cutacnyl 2,5		
peroxyde de benzoyle	2,5 g	1 g
Cutacnyl 5		
peroxyde de benzoyle	5 g	2 g
Cutacnyl 10		
peroxyde de benzoyle	10 g	4 g
Excipient : carboxypolyméthylène, édétate de sodium, dioctylsulfosuccinate de sodium, silice colloïdal anhydre, propylèneglycol, polyoxypropylèneglycol, polyoxyéthyléné, solution d'hydroxyde de sodium à 10%, eau purifiée.		

Propriétés

Antiacnéique local

Dans l'état actuel de nos connaissances, la pathogénèse de l'acné associe plusieurs facteurs :

- hypersécrétion séborrhéique (sous la dépendance des androgènes)
- rétention du sébum, par anomalie de la kératinisation de l'infra-infundibulum du follicule pilosébacé, aboutissant à la formation de comédons et microkystes (éléments sémiologiques essentiels).
- réaction inflammatoire induite par des germes saprophytes (*propionibacterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis*, ...) et certains composants irritants du sébum, aboutissant à la formation de papules inflammatoires, de pustules et de nodules.

Le peroxyde de benzoyle agit essentiellement par action antibactérienne sur le *P. acnes*, principal responsable des phénomènes inflammatoires; il est, accessoirement, modérément kératolytique et sébostatique. La formule principale aqueuse de l'excipient (86% d'eau), diminue les risques d'irritations observées parfois en début de traitement.

Sort du médicament

le peroxyde de benzoyle pénètre dans la peau où il est transformé en acide benzoïque qui passe dans la circulation systémique.

Indications

Acne vulgaire.

Cutacnyl 2,5 et Cutacnyl 5 sont préférentiellement utilisés dans les cas suivants :

- acnés débutantes de l'adolescent;
- chez les sujets à peau fragile, notamment les enfants, les sujets blonds ou roux;
- en début de traitement, en période d'essai, afin de s'assurer de la bonne tolérance du produit;
- en cure d'entretien des acnes blanchies.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez des malades sensibles aux peroxydes (eau oxygénée)

Précautions d'emploi

Des informations précises fournies au malade pourront éviter l'arrêt prématuré et injustifié du traitement.

- Une irritation discrète est possible, surtout en début de traitement; elle ne témoigne pas d'une intolérance ou d'une allergie au topique tant qu'elle reste modérée. Il convient cependant de tester la sensibilité individuelle en faisant précéder la mise en route du traitement par une "touche d'essai".

- Pour réduire au minimum ces phénomènes d'irritation :

- ne pas appliquer sur une peau déjà irritée par des traitements préalables;
- éviter, en règle générale, l'emploi concomitant avec d'autres thérapeutiques locales kératolytiques ou détersives;
- utiliser un pain de toilette doux (toilette pas plus de 2 fois/j); s'abstenir de tout cosmétique ou autre produit parfumé ou alcoolisé;
- ne pas s'exposer au soleil en début de traitement; par la suite il est préférable d'utiliser un filtre solaire;
- ne pas se servir de lampes à UV
- une prudence particulière est recommandée pour les sujets à teint clair et sur certaines zones tégumentaires plus fragiles (cou, décolleté, creux sous-claviculaire, pourtour des yeux et de la bouche).

- Si les phénomènes d'irritation s'avèrent gênants, espacer les applications et (ou) utiliser les formes moins concentrées.

Si l'irritation gênante persiste malgré les précautions d'emploi, le traitement devra être interrompu.

- En cas d'application accidentelle sur les muqueuses (yeux, bouches, narines) ou sur les paupières, rincer très soigneusement à l'eau.

- Eviter l'application sur une plaie ou une lésion cutané préalable.

Effets indésirables

- Photosensibilisation
- Phénomènes irritatifs importants ou prolongés, malgré la bonne observance des précautions d'emploi.
- Décoloration de certaines fibres textiles (vêtements, literie, ...)

Mode d'emploi et posologie

A adapter en fonction de la réponse thérapeutique et de la tolérance individuelle (cf. Précautions d'emploi).

En générale, 1 ou 2 applications quotidiennes.

Une application tous les 2-3 jours en cure d'entretien pour Cutacnyl 2,5 et Cutacnyl 5.

Appliquer Cutacnyl en légers massages du bout des doigts jusqu'à pénétration complète du produit. Se laver les mains après emploi du produit.

Conditions de conservation

Tenir à l'abri de la chaleur; éviter la proximité d'une flamme.