

R O Z E X[®]

métronidazole gel



COMPOSITION :

Métronidazolesept cent cinquante milligrammes (0,750 g)
Excipients : propylène glycol, carbomère 940, édétate de sodium,
méthylparabène, propylparabène, hydroxyde de sodium,
eau purifiéeq.s.p.100 g.
Tube de 30 g contenant 0,225 g de métronidazole.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Ce médicament est un gel pour application locale contenant du métronidazole.
Ce médicament est préconisé dans le traitement local de la rosacée.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :
- Allergie à l'un des constituants du produit.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Eviter le contact avec les yeux.
- Grossesse, allaitement : prévenir votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS,
IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À
VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MÉDICAMENT :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES
PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.

Il est possible que survienne :

- une irritation modérée de la peau (picotements, démangeaisons, sensation de cuisson) ; ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Appliquer le gel en couche mince sur toute la surface à traiter, deux fois par jour, après la toilette.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT SUR LA LISTE I.

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DÉLIVRER QUE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE ORDONNANCE. CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS,
- NE PAS LE RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL,
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

DURÉE DE STABILITÉ :

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

Médicament autorisé n°333 669.2 - Liste I.

Remboursé Sécurité Sociale. Agréé aux collectivités.

INTERNATIONAL
GALDERMA 

Laboratoires GALDERMA
20, avenue André Malraux
92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex