

MUCINUM® à l'extrait de cascara

comprimés enrobés

COMPOSITION PAR COMPRIMÉ : Extrait d'écorce de Cascara 40 mg • Extrait de feuilles de Séné 30 mg • Poudre de feuilles de Boldo 50 mg • Poudre de fruits d'Anis Vert 30 mg • Excipients q.s.p. un comprimé enrobé. 1 comprimé contient 0,09 g de saccharose.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : LAXATIF STIMULANT (A : appareil digestif et métabolisme)

INDICATION : ce médicament est un laxatif stimulant, il stimule l'évacuation intestinale. Il est préconisé dans le traitement de courte durée de la constipation occasionnelle de l'adulte.

CONTRE-INDICATIONS : certaines maladies de l'intestin et du côlon • en cas de douleurs abdominales • en cas de constipation chronique • enfants de moins de 10 ans. Ce médicament est généralement déconseillé en association avec certains diurétiques ou certains médicaments pour le cœur ainsi que chez les enfants de 10 à 15 ans.

EFFETS INDÉSIRABLES : douleurs abdominales, diarrhée : il faut arrêter le traitement et prévenir votre médecin • risque de diminution de la quantité de potassium dans le sang • une coloration anormale des urines est possible.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : signalez tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien, notamment amiodarone, bretylium, disopyramide, quinidines, sotalol, astémizole, bépripil, érythromycine I.V., halofantrine, pentamidine, sultopride, terfénaprine, vincamine.

GROSSESSE, ALLAITEMENT : ce médicament n'est pas recommandé durant la grossesse et l'allaitement. **Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

MISES EN GARDE : constipation occasionnelle : ce médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie ou accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin • constipation chronique : elle ne doit pas être traitée par un laxatif stimulant. **DURÉE DU TRAITEMENT :** ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement • **si le traitement est insuffisant, ne pas augmenter la dose ni prolonger l'usage mais demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

MODE D'UTILISATION ET POSOLOGIE : voie orale 1 à 2 comprimés le soir au coucher • **RÉSERVÉ À L'ADULTE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PRÉSENTATION : boîte de 20 comprimés enrobés.

Médicament autorisé n° 341 095.1.

Date de révision de la notice : 29 septembre 2008