POLYGYNAX® Capsules vaginales

COMPOSITION : Principes actifs : Sulfate de Néomycine : 35 000 UI • Sulfate de Polymyxine B : 35 000 UI • Nystatine : 100 000 UI • Diméthylpolysiloxane : 2,2 g environ • Excipient q.s.p.1 capsule de 3,2 g. Boîtes de 6 et 12 capsules vaginales.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : anti-infectieux local (G : système génito-urinaire). **INDICATIONS :** traitement local d'infections vaginales.

CONTRE INDICATIONS : • Allergie à l'un des composants ou à un autre produit de la même famille • Utilisation de diaphragmes et de préservatifs en latex.

MISES EN GARDE SPECIALES : en cas d'intolérance locale ou de réactions allergique, arrêter le traitement. En cas d'allergie locale, l'utilisation ultérieure du même antibiotique ou d'antibiotiques apparentés par voie orale peut être compromise.

PRECAUTIONS D'EMPLOI : prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale. Ne pas dépasser la durée du traitement préconisée par votre médecin.

INTERACTIONS : ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) et des préservatifs.

EFFETS SECONDAIRES: possibilité d'eczéma allergique de contact ou à distance du lieu d'application, en cas d'emploi prolongé. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien, tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Pendant l'allaitement l'utilisation de ce médicament est à éviter. D'une façon générale il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI : RESERVE A L'ADULTE. Une capsule à mettre au fond du vagin le soir pendant 12 jours. Mettre l'ovule de préférence en position allongée : la façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

Conseils pratiques : • afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette) • porter des sous-vêtements en coton • éviter les douches vaginales • éviter de porter des tampons internes pendant le traitement • ne pas interrompre le traitement pendant les règles • votre médecin pourra traiter votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine.

CONSERVATION : ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. A conserver à une température inférieure ou égale à 25° C. Médicament autorisé N° 308 502-0 : 6 capsules - N° 336 026-5 : 12 capsules. Ce médicament n'est délivré que sur ordonnance médicale. NE PAS AVALER. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

TITULAIRE : LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL - 22, avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France
FABRICANT : INNOTHERA CHOUZY - Rue René Chantereau - L'Isle Vert - 41150 Chouzy-sur-Cisse - France