

MONOCINQUE®

isosorbide-5-mononitrate 40 mg

La substance active du MONOCINQUE est l'isosorbide-5-mononitrate, un métabolite actif de l'isosorbide dinitrate, médicament largement employé pour le traitement de l'insuffisance coronarienne. Par rapport au dinitrate, le MONOCINQUE présente deux avantages: une meilleure disponibilité biologique après administration orale et une action plus prolongée dans le temps.

INDICATIONS

Traitements de maintien de l'insuffisance coronarienne, prophylaxie des attaques d'angina pectoris, traitement post-infarctus du myocarde, traitement de maintien de l'insuffisance chronique du myocarde, également associé avec des cardiotoniques et des diurétiques. Le MONOCINQUE n'est pas indiqué pour contrôler les crises aiguës de sténocardie à cause de ses propriétés pharmacologiques.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité individuelle reconnue à l'isosorbide aussi bien mononitrate que dinitrate. La préparation ne doit pas être administrée au cours de la phase aiguë d'infarctus du myocarde, dans les cas d'insuffisance circulatoire aiguë (choc, collapsus circulatoire), de grave hypertension artérielle. En cas d'hypotension artérielle, la préparation doit être administrée uniquement sur prescription du médicin.

EFFECTS SECONDAIRES

Aux doses prescrites, aucun effet collatéral d'importance n'est apparu. Comme tous les dérivés nitrés, il peut engendrer des céphalées d'intensité et de durée assez variables, une vasodilatation cutanée avec renflements, des crises transitoires de vertiges et d'asthénie, une hypotension artérielle orthostatique, des manifestations cutanées, une dermatite exfoliatrice.

De temps à autres, on peut rencontrer une forte sensibilité aux effets hypotensifs des dérivés nitrés, avec l'apparition, même aux doses thérapeutiques, de symptômes accentués comme nausée, vomissement, asthénies, agitation, pâleur, transpiration et collapsus. Lorsqu'apparaît un de ses effets collatéraux, appeler aussitôt le médicin traitant.

Chez les patients présentant une labilité circulatoire, des symptômes de collapsus peuvent se manifester lors de la première ingestion. Ces symptômes, de même que la céphalée due au nitrate, peuvent être en grande mesure évités par un traitement initial d'une demi-comprimé de MONOCINQUE le matin et d'un demi-comprimé le soir.

AVERTISSEMENT

Utiliser avec précaution chez les patients atteints de glaucome.

Chez les femmes en état de grossesse, le produit doit être administré uniquement en cas de nécessité effective, sous contrôle direct du médicin. Le médicament peut agir comme antagoniste physiologique de la noradrénaline, l'acetylcholine, l'histamine et d'autres substances. Une accoutumance à la préparation peut apparaître, de même qu'une accoutumance croisée avec dérivés nitrés.

INTERACTION MEDICAMENTEUSES ET INCOMPATIBILITÉ

La consommation simultanée d'alcool peut augmenter les effets hypotensifs des dérivés nitrés et réduire les réflexes, par exemple, lorsqu'on conduit un véhicule ou qu'on contrôle des appareillages.

A doses élevées, le MONOCINQUE peut renforcer l'action d'éventuelles autres préparations hypotensives, administrées en même temps.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Sauf prescription différente du médicin, la posologie est de 1 comprimé de MONOCINQUE trois fois par jour, après les repas, à ingérer avec un peu de liquide, sans mâcher.

Chez les patients présentant une labilité circulatoire, des symptômes de collapsus peuvent se manifester lors de la première prise. Ces symptômes, de même que la céphalée due au nitrate, peuvent être en grande mesure évités par un traitement initial d'un demi-comprimé de MONOCINQUE le matin et un demi-comprimé le soir.

PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés. Chaque comprimé contient 40 mg d'isosorbide-5-mononitrate.

Conserver hors de la portée des enfants.

Istituto
LUSO FARMACO d'Italia S.p.A.
Milan - (Italie)

