

# NASIVIN

Décongestant nasale, gouttes

## Composition:

**NASIVIN Enfant** : Solution aqueuse  
d'hydrochloride d'oxymetazoline  
à 0.025%

**NASIVIN Adultes**: Solution aqueuse  
d'hydrochloride d'oxymetazoline  
à 0.05%

## Propriétés:

A l'utilisation local, **NASIVIN** a un effet vasoconstricteur et décongestant intensif sur la muqueuse nasale. L'effet commence après quelques minutes de l'instillation et dure 6 à 8 heures

## Indications:

Coryza aigue, inflammation des sinus paranasals, syringite.

## Posologie et mode d'emploi:

**NASIVIN** 0.025% (gouttes nasale Enfant) à donner uniquement aux enfants au dessous de 1 ans, Pencher la tête en arrière et instiller 1 à 2 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou selon avis médical.

**NASIVIN** 0.05% (gouttes nasale adulte) à donner aux adultes et enfants

à l'âge scolaire. Instiller 1 à 2 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

### Précautions:

Ne Jamais utiliser **NASIVIN** hors recommandation. Usage temporaire, sans prescription médicale, ne doit jamais dépasser les 4 semaines. Usage à limiter au cours de premier trimestre de la grossesse.

### Présentation:

Flacons de 10mL avec compte gouttes.

#### Ceci est un médicament

- Médicament est un produit qui affecte votre santé, et sa consommation hors des instructions est dangereuse.
- Bien suivre la prescription médicale, mode d'emploi et les instructions données par le pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les seuls experts en médicaments leur bénéfices et risques.
- Ne Jamais arrêter le traitement prescrit pour vous sans avis médical.
- Ne Jamais reprendre le même médicament prescrit sans conseil de votre médecin.

Garder tous médicaments hors de portée des enfants



Fabriqué par: **Julphar**

Industries Pharmaceutique du Golfe,  
Ras Al Khaimah - E.A.U.

Sous licence émise par MERCK  
Fédérale de Germany