

PRO + IND

Qu'est-ce que l'Amoximex® et quand est-il utilisé?

Amoximex® contient un antibiotique du groupe des pénicillines pour le traitement d'infections bactériennes. Non seulement il inhibe la croissance des germes sensibles à l'Amoximex® mais il en provoque la destruction dans la plupart des cas. Amoximex® ne doit être utilisé que sur prescription du médecin.

Amoximex® est indiqué dans le traitement d'infections comme:

- infections pulmonaires et des voies respiratoires, comme par ex. pneumonie, poussée de bronchite chronique avec suppuration;
- infections de la sphère ORL (nez, gorge, oreilles)
- infections génito-urinaires, comme par ex. infections rénales et du bassinet, inflammations de la vessie, infections de la prostate, infections des ovaires, gonorrhée, etc;
- infections aiguës et chroniques des voies biliaires et du tractus gastro-intestinal.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin pour le traitement de votre maladie actuelle. Il ne doit pas être utilisé pour le traitement d'autres maladies ni être donné à une tierce personne.

L'antibiotique contenu dans Amoximex® n'est pas utilisable contre tous les microorganismes causant des maladies infectieuses. Pour éviter de pénibles complications pouvant être causées par l'administration d'un antibiotique mal choisi ou dont le dosage n'est pas correct, vous ne devez pas utiliser Amoximex® pour le traitement d'autres maladies ou d'autres personnes.

Quand Amoximex® ne doit-il pas être utilisé?

CJ
Les patients présentant une hypersensibilité à la pénicilline ou aux céphalosporines, souffrant d'une maladie de Pfeiffer (mononucléose infectieuse) ou d'une leucémie lymphatique ne doivent pas prendre Amoximex®.

Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de la prise d'Amoximex®?

VE
Veuillez annoncer à votre médecin si vous avez souffert d'effets indésirables marqués au cours d'un traitement antérieur aux antibiotiques ou si vous n'avez pas bien supporté un traitement à l'Amoximex®.

Une prudence particulière est recommandée lors de l'administration d'Amoximex® si vous souffrez d'allergies comme l'asthme, le rhume des foins ou l'urticaire, en raison de l'apparition plus fréquente de réactions d'hypersensibilité.

CJ
Chez les patients souffrant de goutte et traités à l'allopurinol, des réactions cutanées allergiques peuvent se produire de manière plus marquée lors de l'administration simultanée d'Amoximex®.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez simultanément des préparations contenant de la digoxine.

On ne peut pas exclure une diminution de l'efficacité de la pilule anticonceptionnelle lors de la prise simultanée d'Amoximex®.

L'effet d'Amoximex® peut être modifié par la prise simultanée d'autres médicaments contre les infections ou contre les rhumatismes.

Si vous souffrez d'une affection rénale grave, veuillez le mentionner à votre médecin.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!)

Amoximex® peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez, vous ne devriez, par mesure de précaution, prendre aucun médicament sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Laissez votre médecin décider si vous devez être traitée à l'Amoximex® durant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Amoximex®?

Sauf prescription contraire du médecin, la dose quotidienne recommandée pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans est de 1,5 – 3 g de substance active selon la gravité de l'infection et son évolution, à partager en 3 (–4) prises.

La dose quotidienne recommandée pour l'enfant jusqu'à 2 ans est 3 (–4) fois par jour 100 mg (= 1/2 mesurette); pour l'enfant de 2 – 12 ans, 3 (–4) fois par jour 200 mg (= 1 mesurette).

Prendre les comprimés avant ou après les repas, à chaque fois avec une quantité suffisante de liquide. En cas d'estomac sensible, on recommande de prendre les comprimés après les repas. Pour le traitement d'infections chez les enfants, ou recommande d'utiliser le sirop Amoximex®.

Pour permettre une meilleure conservation, le flacon de sirop contient des granulés. Avant l'utilisation, remplir avec de l'eau jusqu'à la marque (anneau) située sur le flacon en verre, bien refermer et agiter immédiatement énergiquement. Finalement, ajouter à nouveau de l'eau jusqu'à la marque, bien refermer et agiter énergiquement. (Si vous le souhaitez, le pharmacien peut préparer le sirop lui-même).

Bien agiter le sirop avant chaque utilisation. Une fois préparé, le sirop peut être conservé 12 jours à température ambiante (15 - 25 °C).

Lorsque vous avez commencé un traitement à l'Amoximex®, vous devriez le poursuivre aussi longtemps que le médecin vous l'a prescrit. Le traitement ne devrait pas être interrompu sans une consultation médicale préalable.

Une durée d'administration trop courte ou un arrêt trop rapide du traitement peuvent provoquer une réapparition de la maladie. Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets indésirables Amoximex® peut-il avoir?

Il peut survenir occasionnellement de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, des inflammations de la muqueuse buccale ou des rougeurs de la peau; ces effets sont cependant la plupart du temps passagers.

Veuillez consulter immédiatement un médecin s'il apparaît des diarrhées massives, sanguinolentes ou persistantes. Dès l'apparition d'une allergie se manifestant par des rougeurs, des éruptions cutanées, des démangeaisons et des troubles respiratoires, arrêter immédiatement de prendre le médicament et allez voir un médecin sans attendre.

Veuillez informer immédiatement votre médecin ou votre pharmacien s'il survient un signe quelconque de maladie que vous supposez en rapport avec la prise d'Amoximex®.

De quoi faut-il en outre tenir compte?

Si vous êtes diabétique, prenez garde au fait que le sirop Amoximex® 5% contient du saccharose (sucre de canne) dans les quantités suivantes:

1 mesurette à 4 ml du sirop Amoximex® à 5% contient 1,65 g de saccharose, correspondant à 0,066 EF.

Conserver Amoximex® à température ambiante (15 - 25 °C) dans son emballage original fermé et hors de la portée des enfants.

Conservation: le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention »EXP.«.

Lorsque le traitement est terminé, veuillez rapporter ce qui reste du médicament à votre médecin ou à votre pharmacien afin de le détruire.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Que contient Amoximex®?

Amoximex® contient comme substance active de l'amoxicilline (sous forme de trihydrate d'amoxicilline).

Comprimés à 375, 500, 750 et 1000 mg d'amoxicilline, des excipients.

Sirop 5%: 1 mesurette (= 4 ml de sirop) contient 200 mg d'amoxicilline, des arômes et 1,65 g de saccharose, correspondant à 0,066 EF, des excipients.

Où obtenez-vous Amoximex®? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale non renouvelable.

Comprimés: 16 comprimés à 375 mg

16 comprimés à 500 mg

20 comprimés à 750 mg

10 comprimés à 1000 mg

Sirop: flacon contenant 40 g de granulé pour la fabrication de 80 ml de sirop à 5%

flacon contenant 50 g de granulé pour la fabrication de 100 ml de sirop à 5%

Distributeur: CIMEX SA, 4253 Liesberg

Ce prospectus d'emballage a été approuvé par les autorités de contrôle des médicaments (OICM) en septembre 1997.