

ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف

الاستعمال خلال الحمل والإرضاع
ينصح بعدم تناول هذا الدواء من قبل المرأة الحامل وأثناء الإرضاع، نظراً لعدم توفر أي معلومات.
في حال اكتشاف الحمل أثناء تناولك لهذا الدواء يجب إيقاف تناول الدواء واستشارة الطبيب المعالج.
يجب أن تستشير الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

لائحة السواغات التي لها تأثير معروف
لاكتوز، ليسيتين الصويا.

تفاعلات مع أدوية أخرى:

لتفادي التداخلات الناتجة عند أخذ أدوية مختلفة في نفس الوقت يجب دائماً وبشكل فوري إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء تتناولونه أو سبق تناوله منذ فترة قريبة، حتى لو كان الأمر يتعلق بدواء يمكن الحصول عليه من دون وصفة طبية، بالأخص عند تناول دواء آخر للكولسترول (فيبرات أو ستاتين)، مضادات التخثر التي يتم تناولها عبر الفم أو السيكلوسبورين.

كيفية تناول ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف؟

لدى البالغين وكبار السن:
إن المقدار الموصى به هو قرص واحد في اليوم.

لدى المصابين بالقصور الكلوي:
يوصى بتخفيض المقدار.

في كل الأحوال عليك الالتزام بدقة بوصفة طبيبك.

إذا كان لديك انطباع أن ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف هو قوي جداً أو ضعيف جداً، استشر طبيبك أو الصيدلي.

يتم تناوله عبر الفم.

يتم العلاج عبر تناول جرعة واحدة في اليوم.

يجب ابتلاع القرص بكامله أثناء تناول الطعام.

يشكل هذا الدواء بالمواكبة مع نظام الحماية علاج أعراض ويجب تدميده مع المراقبة المنتظمة. ومن أجل استعمال أمثل لا بد من الخضوع لمراقبة طبية منتظمة.

إذا قمت بتناول كمية إضافية من ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف دون موجب لذلك: استشر فوراً طبيبك أو الصيدلي.

إذا نسيت تناول ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف: لا تضاعف الكمية لتعويض نقص المقدار الذي نسيت تناوله.

ما هي الأعراض الجانبية، إن وجدت؟

مثل جميع الأدوية الأخرى، قد يؤدي تناول ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف إلى ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها:
- اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الأمعاء (آلام في البطن، غثيان، تقيؤ، إسهال و انتفاخ البطن)،
- ظهور ردات فعل جلدية (التهيج، الحكة) من نوع الحساسية أو تحسس للضوء على مستوى الجلد (خلال التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية) في المناطق المعرضة للشمس أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية،
- ارتفاع عابر في كمية ترانز أمينيز (أنزيمات الكبد)، يرقان،
- آلام عضلية.

إذا شعرت بأي ألم في العضلات أو حساسية عضلية مؤلمة أو ضعف في العضلات، اتصل بطبيبك فوراً لأن الاضطرابات العضلية قد تكون خطيرة في بعض الحالات النادرة.

- في حالات نادرة: حساسية صفرافية، التهاب الكبد، عجز، التهاب البنكرياس، فقدان الشعر، اعتلال رنوي خلالي،
- من الممكن ملاحظة ارتفاع في نسب الكرياتينين والبول في الدم، بالإضافة إلى نقص نسبة خضاب الدم وعدد الكريات البيض،
- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الذي يسبب آلاماً في البطن)،
- انسداد خثاري: سدة رئوية (جلطة يمكنها التسبب بالآلام في الصدر وضيق تنفس)،
خثار وريدي عميق (جلطة قد تتسبب باحمرار وآلم وانتفاخ في الساق).

قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أية أعراض غير مرغوب فيها لم يتم ذكرها في هذه النشرة.

كيفية حفظ ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف

يحفظ ضمن درجة حرارة لا تتجاوز +30 د. م.
يتأثر هذا الدواء بالرطوبة، لذلك يحفظ ضمن غلافه الخارجي.
يجب أن يبقى بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الاستعمال المذكور على العلبة.
تاريخ آخر تصديق لهذه النشرة: يونيو 2010.

يجب قراءة كامل هذه النشرة بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
• إذا كانت لديك أسئلة، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو من الصيدلي.
لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم أبداً بإعطائه لشخص آخر، حتى في حالة وجود أعراض مشابهة، لأنه قد يتعرض للضرر بسبب ذلك.

ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف

المادة الفاعلة هي: فينوفيرات (160 ملغم)
المكونات الأخرى هي: لوريل سولفات الصوديوم، لاكتوز أحادي الهيدرات، بوفيدون، سليبولز كريستالين متناهي الصغر سيليسي، سيلبكا كوليدي عديم الماء، كروسبوفيدون، ستياريل فومرات الصوديوم.
تركيبة غلاف القرص: © OPADRY : كحول متعدد الفينيل، ثاني أكسيد التيتان (E171)، تالك، ليسيتين الصويا، صمغ كزانتان.

المالك:

Laboratoires FOURNIER S.A.
28, boulevard Clemenceau
21000 DIJON, FRANCE

المصنع:

RECIPHARM FONTAINE
Rue des Prés - Potets
21121 FONTAINE LES DIJON, FRANCE

ما هو الليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف، وفي أي حالات يستعمل؟

يقدم هذا الدواء تحت شكل أقراص مغلفة. علبة من 30 قرصاً.
هذا الدواء يؤدي إلى تخفيض الدهون في الدم / تخفيض إنتاج الكولسترول والترايغليسيريد في الدم/ فيبرات.

يستعمل هذا الدواء من أجل تخفيض فرط الكولسترول في الدم (في حالة الارتفاع غير العادي لمعدل الكولسترول في الدم) و/أو فرط الترايغليسيريد (في حالات الارتفاع غير العادي لمعدل الترايغليسيريد - الدهون - في الدم) لدى البالغين، عندما تكون الحماية المناسبة المتبعة غير كافية.

معلومات ضرورية قبل تناول ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف

لا يستعمل ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف في الحالات التالية:

- قصور كبد (اضطراب في وظائف الكبد)،
- قصور كلوي (اضطراب في وظائف الكلى)،
- حساسية معروفة تجاه الفينوفيرات، ليسيتين الصويا، الفستق، زيت الفستق أو أحد مكونات هذا الدواء،
- التفاعلات الضوئية المؤذية أو التحسسية (تفاعلات الجلد بعد التعرض للشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية) خلال العلاج بالفينوفيرات أو بالمواد المرتبطة بها بنائياً، بشكل خاص كيتوبروفين (دواء مضاد للالتهاب)،
- حساسية صفرافية،
- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الذي يسبب آلاماً في البطن) إلا إذا كان سبب التهاب البنكرياس الحاد هو ارتفاع حاد في مستوى الدهون في الدم،
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة،
- لدى الأطفال.

يجب اتخاذ احتياطات خاصة مع ليبنتيل 160 ملغم، قرص مغلف

- في حالة المعاناة من الآلام العضلية، يجب استشارة الطبيب المعالج فوراً (يرجى مراجعة فقرة «ما هي الأعراض الجانبية، إن وجدت؟»).
- يجب إجراء اختبارات الكبد قبل بدء العلاج وتكرار بانتظام خلال السنة الأولى من العلاج (بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر).
- يتوجب مراقبة نسبة الكرياتينين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج بسبب وجود اللاكتوز، يجب عدم استخدام هذا الدواء في حالات الجلاكتوزيميا الوراثية ومتلازمة سوء امتصاص الجلوكوز والجلاكتوز أو مرض نقص أنزيم اللاكتاز (أمراض أيضية نادرة).

هذا دواء

إن هذا الدواء هو عبارة عن مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يشكل خطراً عليك.

- اتبع وصفة الطبيب بدقة وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي باع لك الدواء.

- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- لا تقطع فترة العلاج الموصوف من تلقاء نفسك.

- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة طبيبك.

- إحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيدالة العرب.