

هذا الدواء

- مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر، اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي يأهلك لك.
- الطبيب والصيدلي هما خبران في الدواء وفي نفعه وضرره.
 - لا تقطع منه العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
 - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
 - لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادة العرب

ما هو دواء أنجينوفا ومتى يجري استعماله؟

أنجينوفا هو مستحضر لعلاج الالتهابات وأنواع العدوى التي تصيب الفم واللثة وخاصية الالم الحاد والزور وألم اللع ومرض اللثاء الذي يصيب الأطفال خاصة في منطقة الفم والحلق (عدوى كاتنديدا) ومرض الأكلة (قرحة أكلة بالفم) فضلاً عن استخدامه كعلاج مصاحب أو مكمل لمرض الخناق (الخناق المسريري). يحتوي كل قرص من دواء أنجينوفا على مادتين فعاليتين: إدراهما هي كلوريد ديكوبينوم وهي مادة فعالة في مكافحة معظم أنواع البكتيريا والفطريات التي تسبب أنواع العدوى المختلفة بالفم والحلق أو الزور بالإضافة إلى فطريات الخبرة (كاثنديدا). الأخرى هي ليدوكابين وهي مادة مخففة للألم وتنطفل عملية النعس.

متى لا يسمح باستعمال دواء أنجينوفا؟

لا يسمح باستعمال دواء أنجينوفا في حالة وجود أي نوع من أنواع الحساسية ضد أي مادة من مكوناته. غير ملائم للأطفال تحت عمر (سن) اثني عشر (١٢) عاماً.

متى يجب مراعاة الحيطة عند استعمال دواء أنجينوفا؟

- نظراً لانخفاض فاعليته تحت تأثير معجون الأسنان، يجب تجنب تناول أقراص أنجينوفا بعد وقت قصير من تنظيف الأسنان. في حالة وجود حمى مرتفعة أو عدم استجابة أعراض المرض للعلاج فيغضون أسبوع أو إذا ساءت الحالة المرضية، فيتعين عليكم القيام باستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه. في مثل تلك الحالة ينبغي عليكم أيضاً إخاطة علماء بما إذا:
- كنتم تعانون من أمراض أخرى
 - لديك أي نوع من أنواع الحساسية
 - كنتم تتناولون أدوية أخرى (بما في ذلك أدوية تشترينها من الصيدلية بدون وصفة طبية)

هل يسمح باستعمال دواء أنجينوفا أثناء فترة الحمل أو فترة الرضاعة؟

إذا كنت حاملاً أو تتوينين الحمل، يجب عليك تجنب تناول أي دوارة كإجراء احتياطي أو قومي باستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه. يجب لا تتناولوا أنجينوفا أثناء الحمل أو فترة الرضاعة إلا بعد استشارة طبيب.

كيف يتم استعمال دواء أنجينوفا؟

البالغين أو الشباب المغار أو الأطفال الكبار ابتداء من عمر (سن) اثني عشر (١٢) عاماً: إذا لم يأثر الطبيب المعالج بخلافه، يجري كل ساعتين تناول قرص واحد بوضعه في الفم وامتصاصه ببطء. لم يتم بعد اختبار استعماله وسلامته للأطفال تحت عمر (سن) اثني عشر (٢) عاماً. يجب لا تتعدي الجرعة اليومية اثني عشر (١٢) قرصاً. لا تقوموا من تلقاء أنفسكم بتغيير الجرعات المحددة لكم. إذا تكون لديكم الاعتقاد بأن الدواء ضعيف الفاعلية، مما يجب أو شديد المفعول بأكثر مما هو متوقع، فيتعين عليكم القيام بإحاطة طببكم المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه.

ما هي الآثار الجانبية لدواء أنجينوفا؟

مع تناول دواء أنجينوفا قد تظهر بعض الآثار الجانبية غير المرغوبية: مثل أعراض الحساسية المفرطة التي لوحظت في بعض الحالات. في حالة ظهور أي أعراض للحساسية المفرطة يجب عليكم التوقف عن تناول أقراص دواء أنجينوفا. وفي حالات نادرة تظهر أعراض التهيج أو الإثارة بالأغشية المخاطية للثم. في حالة ظهور أي آثار جانبية أخرى غير مذكورة في هذه النشرة الإducative للمرضي، يتعين عليكم القيام بإحاطة طببكم المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه.

ماذا تتبعن مراواعاته فضلاً عما سبق؟

تحجب مراعاة حفظ الأدوية بصفة عامة بعيداً عن متناول الأطفال! لا يحظر هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ثلاثة (٣٠) درجة مئوية. قوموا فقط باستعمال دواء أنجينوفا حتى تاريخ انتهاء صلاحيته المبين على العبوة أيام عبارة "EXP". يتعين عليكم القيام باستشارة طببكم المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملون معه من أجل الحصول على معلومات أو بيانات إضافية تحتاجونها. فقتل هؤلاء الإخصائيين ليهم المعرفة الشخصية الفضولية.

ما هي محتويات دواء أنجينوفا ومكوناته؟

يحتوي كل غرام واحد (١) من أقراص دواء أنجينوفا على: المواد الفعالة: ربع (٠,٢٥) غرام كلوريد ديكوبينوم، غرام واحد (١) من هيدروكلوريد ليدوكابين السواغات: لاكتوز لامائي، سيلولات الصونبيوم، تكبات النعناع، بوفيدون، غليسيرول ثلاني البيبينات.

أين يمكن الحصول على دواء أنجينوفا؟ وما هي العبوات المتوفرة منه بالأسواق؟
يمكنكم الحصول على دواء أنجينوفا بالصيدليات بدون وصفة طبية بعبوات تحتوي على عشرين (٢٠) قرصاً.

مصنعة بواسطة: شركة روتندورف فارما المحدودة

51 شارع أوستنفلدر، 59320 آينغفلاه، ألمانيا

لصالح:

ميدينوفا شركة مساهمة

medinova

إجبول شتراسه 28، 8050 زيوريخ، سويسرا

888867/36398