

Finallerg®

(Cétirizine dichlorhydrate)

Information Pharmacologique

Mode d'action

Finallerg® (Cétirizine dichlorhydrate) est un antihistaminique H1 sélectif sans aucun effet anticholinergique considérable ou antisérotoninergique (effet de sédation) car la cétirizine ne peut pas passer la barrière hématoencéphalique.

La cétirizine inhibe les premières phases de la réaction cutanée allergique dans laquelle l'histamine sert comme intermédiaire. Elle réduit aussi la migration des cellules inflammatoires telles que les éosinophiles et réduit la libération des médiateurs associés à la réponse allergique tardive, et c'est pour cela que la cétirizine est considérée comme un agent histaminique-antiallergique. La cétirizine réduit aussi l'hyperactivité bronchique de l'histamine chez les patients asthmatiques.

Indications

Finallerg® est indiqué dans le traitement symptomatique de la rhinite saisonnière et la conjonctive, rhinite allergique durable, aussi bien que le prurit et l'urticaire d'origine allergique.

Posologie et administration

Finallerg® peut être pris avec la nourriture, l'eau ou le lait si une irritation gastrique se

Dose adulte habituelle: la dose recommandée est 10mg/jour en une seule prise, préférentiellement pendant le dîner. Si les effets indésirables augmentent, cétirizine peut être prise en 5mg le matin et 5mg le soir.

Enfants de 5 ans et plus: la même dose que les adultes.

Enfants entre 3-6 ans: la dose recommandée est 5mg dans une seule prise ou 2.5mg dans le matin et dans le soir.

Gouttes	20 gouttes=(1ml)=10mg.	10ml solution=10mg.
	10 gouttes=(0.5ml)=5mg.	5ml solution=5mg.
	5 gouttes=(0.25ml)=2.5mg	2.5ml solution=2.5mg.

Contre indications

Finallerg® est contre indiqué chez les patients ayant de l'hyper-sensibilité à n'importe quel constituant.

Précautions

- Croisement de sensibilité: Les patients sensibles à un antihistaminique peuvent être sensibles à d'autres.
- La cétirizine en dose thérapeutique ne cause pas une potentiation de l'effet d'alcool (concernant un taux d'alcool au sang de 0.8 g/L). Malgré ça, une précaution spéciale est recommandée.

Utilisation pendant la grossesse et allaitement: **Finallerg[®]** ne doit pas être utilisé par la femme enceinte durant les trois premiers mois de grossesse, ni chez les femmes en période d'allaitement.

Interférence avec les résultats des tests diagnostiques: Des résultats faussement négatifs des tests faits sur la peau en utilisant les extraits d'allergènes. Il est recommandé d'arrêter Cétirizine 72 heures avant le test.

Interactions médicamenteuses

Il n'y a pas des interactions médicamenteuses connues avec d'autres médicaments, **né** au moins une précaution doit être prise en prenant des.

Effets indésirables

Quand **Finallerg[®]** est administré à des doses recommandées, les effets indésirables qui peuvent survenir sont **comparables au placebo** y compris agitation, sécheresse de la bouche, somnolence et **céphalée**, et **des troubles** gastro-intestinaux

Présentation

Finallerg[®] comprimés pelliculés: Cétirizine dichlorhydrate 1 _ comprimé.
(Disponible en boîtes différentes).

Finallerg[®] Sirop: Cétirizine dichlorhydrate 1mg 1ml.
(Disponible en boîtes différentes).

Finallerg[®] Gouttes orales: Cétirizine dichlorhydrate 10mg 1ml.
(Disponible en boîtes différentes).

(Ceci est un médicament - Garder les médicaments hors de la portée des enfants.)

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation, non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et la mode d'emploi prescrite, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les meilleurs personnes à connaître le médicament, ses avantages et ses risques.
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne répéter pas le médicament sans l'avis de votre médecin.