

Arginine Veyron

Solution buvable - Flacon de 250 ml

COMPOSITION :

CHLORHYDRATE DE L(+)
[Quantité correspondante en L(+)
Excipient : arôme caramel, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), saccharose, saccharine, eau purifiée
pour 100 g de solution buvable - Flacon de 250 ml

Une cuillère à café contient 0,75 g de saccharose.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Cholagogue-cholérétique
Hyp ammoniémiant
(A : Appareil digestif et métabolisme)

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Traitement d'appoint des digestions difficiles (dyspepsies)
Hyperammoniémies congénitales par déficit enzymatique du cycle de l'urée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (0,75 g par cuillère à café).
Utiliser avec précaution en cas d'obstruction des voies biliaires ou de graves maladies du foie.
En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MÉDECIN.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN

GROSSESSE-ALLAITEMENT :

D'une façon générale il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Saccharose (0,75 g par cuillère à café) - parahydroxybenzoate de méthyle (E218)

POSOLOGIE : Avaler avec un peu d'eau

Dyspepsies : 1 à 2 cuillères à café avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles
Hyperammoniémies congénitales : la posologie est fonction du poids de votre enfant. Il est nécessaire de suivre les indications de votre médecin.

**CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :
IL NE PEUT PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS - NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE**

AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MÉDICAMENT

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : risque de diarrhée à forte dose.
SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET INDÉSIRABLE OU GÊNANT QUI N'EST PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE**

DURÉE DE STABILITÉ : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE