

ULTRA-LEVURE 200 GÉLULES

FORME ET PRESENTATION :

Gélules, flacon de 10.

COMPOSITION :

- *Saccharomyces boulardii* lyophilisé 226 mg
(correspondant à 200 mg de cellules de levure et 26 mg de lactose)
- Excipients: stéarate de magnésium q.s.p. une gélule.

PROPRIETES :

ANTIDIARRHEIQUE.

Flore de substitution

(A : appareil digestif et métabolisme)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Traitement des diarrhées infectieuses aiguës de l'adulte et de l'enfant.
- Prévention et traitement des diarrhées et colites associées à l'antibiothérapie.
- Traitement préventif des rechutes d'infections intestinales à *Clostridium difficile* en association à la vancomycine ou au métronidazole.
- Prévention et traitement des diarrhées au cours de l'alimentation entérale à débit continu.
- Traitement du syndrome du côlon irritable.

Ce traitement ne dispense pas d'une réhydratation si elle est nécessaire; l'importance de la réhydratation et sa voie d'administration (per os ou IV) doivent être adaptées à l'importance de la diarrhée, à l'âge et au terrain du sujet.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

ULTRA-LEVURE est constitué de cellules vivantes, il ne doit pas être mélangé avec un liquide ou un aliment trop chaud (plus de 50°C), glacé ou alcoolisé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

ULTRA-LEVURE 200 mg gélules, du fait de sa nature fongique, ne doit pas être administré simultanément avec un médicament antifongique oral ou systémique.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Patients porteurs d'un cathéter veineux central.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Les gélules sont à avaler avec un verre d'eau.

POSOLOGIE :

1 à 2 gélules, 1 à 2 fois par jour.

EFFETS SECONDAIRES:

De rares cas de troubles épigastriques ont été rapportés, ne nécessitant pas l'arrêt du traitement.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

BIOCODEX

7 avenue Gallieni
91250 Ceully - France

BIOCODEX