

Pastilles Drill Miel Rosat

MAUX DE GORGE

Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION, destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.

Veuillez lire attentivement la notice, elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Drill, MIEL ROSAT pastille à sucer

Les substances actives sont :

Solution de gluconate de chlorhexidine à 20 pour cent

quantité correspondant à gluconate de chlorhexidine..... 3,00 mg

Chlorhydrate de tétracaine

0,20 mg

Les autres composants sont : ascorbate de sodium, saccharose, glucose liquide, miel blanc, glycyrrhizinate d'ammonium, extrait de réglisse sec, arôme naturel de rose (huile essentielle de rose, alcool). Pour une pastille de 2,5 g.

Titulaire et exploitant : LABORATOIRES PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel-Gance, 92 100 Boulogne - France

Fabricant : Diététique et Pharmacie - Zi de la coudette, 32290 Aignan - France

1 - QU'EST-CE QUE DRILL MIEL ROSAT, PASTILLE A SUCER ET DANS QUELS CAS CE MEDICAMENT EST-IL UTILISE ?

ANTISEPTIQUE LOCAL, ANESTHESIQUE LOCAL (R : système respiratoire)

Ce médicament contient une association de 2 principes actifs

• un antiseptique local, la chlorhexidine

• un anesthésique local, la tétracaine

Il est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphites et de petites plaies de la bouche.

2 - INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT UTILISATION

• Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux et à la chlorhexidine ou aux autres composants.

Prendre des précautions particulières avec ce médicament :

• L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec l'impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

- De ne pas utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans.

- De ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

• L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

• Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retenir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions, ainsi que sur le cœur.

- L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracaine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
- En cas de diabète ou de régime hypocalorique, tenir compte de l'apport de 2,5 g environ de sucre par pastille.

Mal de gorge : En cas de survenue de fièvre, d'expectorations [crachats] purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Aphites, petites plaies de la bouche : En cas de lésions étendues, d'extension des lésions, d'apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Grossesse et allaitement : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : Saccharose.

- N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiséptique.

Ce médicament contient de la chlorhexidine et un anesthésique local. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

3 - COMMENT PRENDRE DRILL MIEL ROSAT, PASTILLE A SUCER

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Les prises doivent être espacées d'au moins 2 heures.

Adultes : 1 pastille à sucer 4 fois par 24 heures

Enfants de 6 à 15 ans : 1 pastille à sucer 2 à 3 fois par 24 heures.

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Eruption cutanée : dans ce cas arrêtez le traitement.
- Possibilité d'engourdissement passager de la langue.
- En cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander avis à un médecin.
- Une coloration brune de la langue : elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement.
- Une coloration des dents peut également survenir ; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER CE MEDICAMENT ?

Ne laisser ni à la portée, ni à la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ce médicament est sensible à l'humidité, conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Medicament autorisé n° 335.006.0, boîte de 24 pastilles.

Date de révision de la notice : mai 2000.

 Les Laboratoires Pierre Fabre Santé participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

