

# Deflat®

Siméthicone

## Propriétés:

Siméthicone, le principe active de *Deflat*®, est une drogue antifatulent qui élimine la tention superficielle des petites bulles du gaz, qui peuvent être excessivement formées aux voies gastro-intestinales. Les petites bulles du gaz brisent et confluent en formant plus grandes bulles qui peuvent être évacuées facilement par l'éruclation ou expulsion de flatuosités.

## Indications:

- *Deflat*® (Comprimés et Gouttes) est indiqué pour le soulagement des symptômes douloureux tels que: sensations de pression, plentitude de la région épigastrique et le spasme intestinal due à l'accumulation excessive du gaz qui peut être formée au tube digestif dans les cas suivants :
  - La déglutition d'air (aérophagie)
  - Le météorisme temporaire après des excès alimentaires
  - La dyspepsie fonctionnelle
  - Le côlone irritable
  - Ulcère peptique
  - La distention gazeux post-opératoire
- *Deflat*® est utilisé comme une aide diagnostique pour enlever le gaz des voies gastro-intestinales avant la gastroscopie, l'examen des rayons X, et l'échographie de la colonne vertébrale et organes abdominaux .

## Posologie et mode d'administration:

*Deflat*® doit être administré comme prescrit par le médecin après les repas et au coucher, les posologies suivants sont recommandées:

### • *Deflat*® Gouttes:

*Nourrissons (moins que 2ans )*: 20 mg(0.5ml)4 fois /jour jusqu'à 240 mg / jour .

*Enfants (2-12)*: 40 mg (1ml) 4 fois/jour .

*Adultes*: 40 - 80 mg (1-2ml ) 4 fois /jour jusqu'à 500 mg/jour .

### • *Deflat*® Comprimés:

Un comprimé 4 fois / jour après les repas et au coucher est recommandé. Les comprimés doivent être bien machés avant qu'ils doivent être avalés seul ou avec un peu du liquid.

- Pour les besoins diagnostiques (examen des rayons X , échographie, et gastroscopie) *Deflat*® Comprimé : peut être administré comme une dose recommandée pendant 2-3 /jours avant le jour d'examen , un autre comprimé supplémentaire est recommandé au jour d'examen.

## Interactions médicamenteuses:

Il n'y a pas une interaction médicamenteuse connue se rapportée à siméthicone.

**Réactions indésirables:**

Siméthicone est physiologiquement inerte et il n'est pas absorbé par l'estomac ou les intestines, donc *Deflat* a un profilé très innocuit même quand il est administré depuis longtemps .

**Mise en garde:**

Pour les nourrissons et enfants, ne pas dépasser la posologie de *Deflat*® Gouttes plus de 12 doses /jour, sauf sous un conseil et une surveillance médicale .

**Information pour le patient:**

Les Gouttes de *Deflat*®:

- Bien agiter le flacon avant l'emploi
- Remplir le compt gouttes jusqu'au niveau posologique recommandé, et distribuer le liquid lentement dans la bouche de l'enfant du côté de la joue intérieure .
- Pour faciliter l'administration, la dose peut être mélangée avec 30ml d'eau frais, le lait diététique pour bébés, ou autre liquid approprié.

**Présentation:**

*Deflat*® Gouttes : Chaque 1 ml de l'émulsion contient 40 mg Siméthicone PEU dans des flacons de 30 ml.

*Deflat*® Comprimés À Croquer : Chaque comprimé contient 120 mg Siméthicone PEU dans des boîtes de 24 comprimés.

(Ceci est un médicaments maintenir hors de la portée des enfants)

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin, et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- Ne le prenez pas sans l'avis de votre médecin.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.