

## سيرو-بي سي<sup>٢</sup> شراب (سيروهيتايدن هيدروكلورايد مع فيتامينات متعددة)

### دواعي الاستعمال

يعطى سيرو-بي سي<sup>٢</sup> لإزالة أعراض فرط الحساسية بما فيها الشرى، الأوجع الوعائية، التهاب الأنف، التهاب التلحمة وفي اضطرابات الجلد الحاككة. إنه ذو تأثير مضاد للموسكارين وذو فعالية مهدئة مركبة.

يستعمل في الوقاية ومعالجة الصداع الوعائي وداء الشقيقة. يوصى بإعطائه للسيطرة على حالات الإسهال للمصاب بالناذر السرطاوي.

إن إضافة الفيتامينات المتعددة إلى جانب سيروهيتايدن هيدروكلورايد تفي المريض من حدوث الموز في الفيتامينات.

### مقدار الجرعة وطريقة الاستعمال

يتوفر سيرو-بي سي<sup>٢</sup> على شكل شراب :  
تحتوي كل ٥ مل منه على:

سيروهيتايدن هيدروكلورايد	٢٠٠٠	ملغم
ثيامين هيدروكلورايد	٠,٦٠ (١)	فيتامين ب
ريبوفلافين	٠,٧٥ (٢)	فيتامين ب
بيريدوكسين هيدروكلورايد	٠,٦٠ (٦)	فيتامين ب
نيكوتيناميد	٥٠,٠	ملغم
حمض الأسكوربيك	٢٠,٠٠ (ج)	فيتامين ج

يمكن إعطاء الجرعة اليومية مرة واحدة عند المساء أو مجزأة على عدة جرعات .

### تفاعلات فرط الحساسية والحكّة:

الأطفال من ٢ - ٦ سنوات : الجرعة القصوى ٤ ملاعق صغار يومياً.

الأطفال من ٧ - ١٤ سنة : الجرعة القصوى ٦ ملاعق صغار يومياً.

المراهقون والبالغون : الجرعة اليومية ١٢ ملغم وتساوي ٦ ملاعق صغار يومياً.

### - الصداع الوعائي وداء الشقيقة:

تعالى لمعتان في حالات الصداع الوعائي وداء الشقيقة ويمكن تكراره بعد ٣٠ دقيقة. الجرعة الداعمة البالغة لمعتين يمكن إعطائها كل ٦ ساعات.

### - التناذر السرطاوي:

نظراً لأن المستحضر مناسب للسروتونين، فهو يساعد على تخفيف الإسهال المرتبط بالناذر السرطاوي عند إعطائه بجرعات مقدارها ٢ - ٤ ملاعق صغيرة كل ستة ساعات.

### - الوقاية من نفض الفيتامينات :

كل ملقعة أو لمعتان تغطي الكمية المطلوبة من الفيتامينات، لمنع النقص في الفيتامينات.

### الاستعمالات

سيرو-بي سي<sup>٢</sup> مناسب لمستقبلات الهيستامين H1 ومناسب للسروتونين. لذلك فهو يستعمل لإزالة أعراض فرط الحساسية واضطرابات الجلد الحاككة أيضاً.

من إستعمالاته أيضاً تخفيف أعراض داء الشقيقة.

فيتامين ج ضروري من أجل تكوين الكولاجين والمواد داخل الخلايا.

فيتامين ب ١ (ثيامين) منتم الفرمي ضروري لإستقلاب الكربوهيدرات.

فيتامين ب ٢ (ريبوفلافين) ضروري لإستقلاب الطاقة من الطعام.

فيتامين ب ٦ يشترك بشكل رئيسي في إستقلاب الأحماض الأمينية. كما يشارك في إستقلاب الكربوهيدرات والدهون. إنه ضروري في تركيب الهيموغلوبين.

نياسيناميد يشكله المنتم لآلانزيم NAD والمنتم لآلانزيم NADP يشارك في تفاعلات نقل الإلكترون في عملية التنفس .

### ردود الفعل المعاكسة - الأعراض الجانبية لمضادات الهيستامين

- التأثير المهدى :

التأثير الأكثر شيوعاً لمضادات الهيستامين هو الهوء الذي يتراوح بين العباس والنوم العميق. هذه التأثيرات تتضال بعد بضعة أيام من المعالجة. قد يحدث تشيظ غير متوقع للجهاز العصبي المركزي خاصة عند الأطفال ويتراقق بسرعة التهيج والأرق والرجفان.

- التأثير المضاد للموسكارين:

تملك منافقات مستقبلات H1 الهيستامينية خصائص مضادة للموسكارين: فم جاف، إفرازات سيكحة من الجهاز التنفسي، ضيق صدر، تشوش الرؤية، صعوبة تناول، نقص نشاط وحركة الجهاز المعدي المعوي تؤدي إلى امساك وزيادة الارتداد المعدي. عند تناول الجرعات العالية يحدث بطء قلبي عام يعلوه تسرع قلبي وخفقان وعدم إنظام.

- الإضطرابات الدموية: ذكرت التقارير حدوث إضطرابات دموية نادرة، وهذه تشمل إنعدام الهيمات، نقص الكريات البيض ونقر دم إنحلاقي.

- تشوهات جنينية:

ترافقت مضادات الهيستامين المختلفة بحصول تشوهات جنينية عندما أعطيت أثناء الحمل.

- الجرعة المتزايدة:

قد تكون الجرعة المترتبة فائقة خاصة عند الرضع والإطفال، وتظني الإثارة العصبية المركزية على التشيظ سببية ترشحاً، وجبات، إثارة، عصب، هلوسة وإختلاجات. عند البالغين يعتبر حدوث التشيظ العصبي المركزي أكثر شيوعاً، يرافقه نواس، سبات وإختلاجات. تطوّر إلى قصور نفسي أو ربما إلى تقلص قلبي وعائي.

### معالجة ردود الفعل المعاكسة لمنافقات مستقبلات الهيستامين H1 (مضادات الهيستامين)

١- يجب إفراغ المعدة فوراً.

٢- يمكن إعطاء محرّضات التقيؤ إذا كان المريض واعياً.

٣- بعض الفحم المنشط.

٤- يمكن السيطرة على الإختلاجات بإعطاء ديازپام بالرغم من وجوب تجنب ميثبات الجهاز العصبي المركزي.

٥- قد تشمل المعالجة العرضية والداعمة التنفس الاصطناعي، تبريد خارجي في حالات إزداد الحرارة الشديدي وإعطاء السوائل داخل الوريد. رانعات، ضغط الدم مثل الدواردورينالين أو فيل الفرين قد تستعمل ولكن لا يجوز إعطاء الادورينالين.

### إحياطات لإستعمال منافقات مستقبلات الهيستامين H1 (مضادات الهيستامين)

١- يجب عدم إستعمال مضادات الهيستامين للأطفال الخناج أو حديثي الولادة، لانهم أكثر تعرضاً للتأثيرات المضادة للموسكارين.

٢- المسنون أيضاً شديدو التعرض لهذه التأثيرات.

٣- المرضى الذين يتناولون مضادات الهيستامين يجب الا يقودوا سيارات او يشغلوا الآليات، كما يجب ان يتجنبوا المشروبات الكحولية.

٤- مضادات الهيستامين يجب ان تستعمل بحذر في حالات الغلوكوما مغلقة الزاوية، الاحتباس البولي، تضخم البروستات او الانسداد البولي الأثني عشري.

٥- للمصابين بالصرع، والاضطرابات القلبية الوعائية الشديدي، والإضطرابات الكبدية يجب ان يستعملوا مضادات الهيستامين بحذر.

٦- مرضى الربو أيضاً يجب ان يتوخوا الحذر.

٧- نشرت دراسات مؤيدة وأخرى معاكسة لاستعمال مضادات الهيستامين أثناء الحمل.

### التفاعلات الدوائية لمضادات الهيستامين

١- قد تسرع مضادات الهيستامين التأثيرات المهدئة لميثبات فعالية الجهاز العصبي المركزي مثل الكحول والباربيتورات والنومات. ومضادات الأم الأفيونية، والمهدئات، المزيل للقلق وحالات الغصاب.

٢- ميثبات المونوامين أو كسادز تسرع التأثير المضاد للموسكارين الذي تحده مضادات الهيستامين، وهذه الأخيرة لها تأثير مضاد للتأثير المضاد للموسكارين يضاف إلى أثر مضادات الموسكارين الأخرى كآلاترونين ومضادات الأكتئاب ثلاثية الحلقات.

٣- قد تشيظ مضادات الهيستامين من نتائج إختبارات، المهارات الداعمية الإيجابية ويجب التوقّف عن إعطائها عدة أيام قبل إجراء هذه الإختبارات.

### ردود الفعل المعاكسة والتحذيرات التي يجب اعتبارها عند تناول الفيتامينات

ردود الفعل المعاكسة بسبب الفيتامينات الموجودة في سيروبي سي<sup>٢</sup> غير وأردة عملياً.

١- حدثت تأثيرات تحسّية عند تناول الفيتامين خاصة بعد إعطائه بطريقة الحقن.

٢- لا توجد ردود فعل معاكسة للريبوفلافين.

٣- حمض الأسكوربيك جيد التحمل عموماً. الجرعات العالية من الفيتامين ج تسبب الإسهال حسب ما ورد في التقارير، بالإضافة إلى إضطرابات معديّة مغبوية أخرى. قد تسبب الجرعات العالية أيضاً فرط بيلة الأوكسالات وتشكل حصوات أوكسالات الكالسيوم في الكلية. قد يزداد التحمّل للمتحضر بالاستعمال المديد للجرعات العالية.

شروط الحزن

يحفظ من الضوء، في مكان غير رطب ودرجات حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية. لا يحفظ في التلاجة.

لا تستعمل الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

يتوفر سيرو-بي سي<sup>٢</sup> في عبوات تحتوي على ١١٤ مل.

### إين هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بحرصك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب، طريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه.

- لا تقطع مدة العلاج بمجرد لك من تناغم نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

صنع في ذوق مصح لبنان في معامل

الوريمض م. م. ل.

٢ علامة تجارية مسجلة