

دولسانا

شراب للسعال

التركيب

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مل) على :	
كاربينوكسامين مالبات	٢,٠٠٠ ملغم
افدرين هيدروكلورايد	٤,٠٠٠ ملغم
أمونيوم كلورايد	١٠٠,٠٠٠ ملغم
منشول	٠,٢٥٠ ملغم
مواد سواغة تكفي لـ ٥٠ مل .	
في شراب ذي نكهة لطيفة.	

الأثر الطبي

إن شراب السعال دولسانا مستحضر مَقَشَّع للسعال، فعال آمن ولذيذ الطعم. كاربينوكسامين مالبات، عامل مضاد للهستامين ذو تأثير مخدر موضعي وذو خصائص مهدئة لطيفة .
إفدرين هيدروكلورايد مزبل للاحتقان وموسع للشعب الرئوية .
يساعد أمونيوم كلورايد على حل وتمييع الإفرازات السميكة اللزجة التي تصاحب عادة نزلات البرد الفيروسية .
المنشول مهدئ وملطف وذو تأثير موضعي طفيف مضاد للالام.

دواعي الاستعمال

شراب السعال دولسانا يوصف لتخفيف السعال الناتج عن الزكام أو الحساسية والسعال المرافق للحالات الحادة أو المزمنة من العدوى في الجهاز التنفسي الأعلى.

مقدار الجرعة

البالغون: ملعقة او ملعقتان صغيرتان (٥ - ١٠ مل) ثلاث الى اربع مرات يوميا.
الأطفال من سن ١٠ الى ١٤ سنة: ملعقة صغيرة واحدة ثلاث او اربع مرات يوميا.
الأطفال من سن ٦ الى ٩ سنوات: نصف ملعقة صغيرة (٢,٥ مل) ثلاث او اربع مرات يوميا.

لا يستعمل للأطفال ما دون ٦ سنوات من العمر.

موانع الاستعمال

افدرين هيدروكلورايد: الغلوكوما المغلقة الزاوية، ورم القواتم، التضخم الحاجزي القديم التناسق، علاج بميثيل أكسيداز أحادي الأمين بالتزامن أو مؤخرًا (الإتمام الـ ١٤ السابقة)، تخدير عمومي بهيدروكربونات هالوجينية (بخاصة الهالوتان)، تسرع دقات القلب الانظمي أو رجفان بطيني، فرط حساسية ضد الإفيدرين أو منتهات أخرى.

الكاربينوكسامين: فرط الضغط الحاد، مرض شرياني تاجي حاد والمرضى الذين يخضعون لعلاج بميثيل أكسيداز أحادي الأمين. المرضى المصابون بجلوكوما مغلقة الزاوية، باحتباس بولي، بقرحة هضمية وخلال نوبة ربو. المرضى المصابون بفرط حساسية ضد الكاربينوكسامين.

تحذيرات

قد يكون السعال المتواصل إشارة إلى حالة خطيرة.
قد يسبب الإفيدرين احتباسًا بوليًا.
يحتوي هذا المستحضر على مضاد هستامين ويمكن أن يسبب النعاس.
يجب استعمال الدواء بحذر لدى المرضى المصابين بفرط ضغط الدم، بمرض قلبي بالربو، بفرط الدرقية، بزيادة الضغط داخل العين، بداء السكري أو بتضخم البروستات.

فرط الجرعة

عوارض فرط الجرعة:
في حال سيطرت تأثيرات مضاد الهستامين، يشكّل الفعل المركزي الخطر الأكبر. لدى الطفل الصغير، تكون العوارض الأساسية الإبرة، الهلوسات، الخللان، عدم التنسيق، الرعاش، تورد الوجه والحمى. في الحالات الحادة قد تحصل اختلاجات وثبات الحدقة أو توسعها وسبات وحتى الوفاة. أما لدى البالغ، فتكون الحمى والتورد غير شائعين؛ وغالبًا ما يسبق الإبرة التي تؤذي إلى اختلاجات وكآبة عقب نشبة نعاس وسبات. عادة لا يضعف التنفس بشكل خطير ويكون ضغط الدم ثابتًا. أما في حال سيطرت عوارض مقلدات الودي، فتتضمن التأثيرات المركزية تمللما، دواراً، رعاشاً،

رذات فعل مفرطة النشاط، ثرثرة، استنارية وأرقاً. تتضمن التأثيرات القلبية الوعائية والكلوية، صعوبة في التنول، صداعاً، توردًا، خفقانًا، لانظمية قلبية، فرط ضغط يليه نقص ضغط ووهط دورانتي. وتتضمن التأثيرات المعدية المعوية جفاف الفم، طعماً معدنيًا، قلة الشهوة للطعام، غثيانًا، تقيؤًا، إسهالًا ومغصًا بطنيًا.

التفاعلات الدوائية

الرجاء أن تعلم طبيبك بأي أدوية تأخذها بما فيها تلك التي تشتريها من دون وصفة طبية.

الإفيدرين: لا ينبغي استعماله بالتزامن مع بعض مضادات الاكتئاب لا سيما مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين نورابينيفرين لأن ذلك يزيد خطر التأثيرات الجانبية بسبب مستويات النورابينيفرين المفرطة في المصل.
الحاصرات الأدرينالية الفعل الفأ، الأروبين، مدرّات البول.

الكاربينوكسامين: يمكن أن تزيد مضادات الهستامين من تأثيرات مضادات الاكتئاب الثلاثية الدوة، الباربيتورات، الكحول ومخمدات الجهاز العصبي المركزي. إن مثبطات الأكسيداز الأحادي الأمين تطول وتقوي التأثيرات المضادة لإفراز الكولين لمضادات الهستامين. قد تحقّض الأمينات مقلدات الودي من التأثيرات المضادة لفرط ضغط الدم للبريزين، قلوئيات الفيراتروم، الميثيلدوبا والميكاميلامين. تزداد تأثيرات مقلدات الودي مع مثبطات أكسيداز الأمين الأحادي والحاصرات الأدرينالية الفعل بيتا.

الحمل والارضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، الرجاء أن تستشير طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

التأثيرات الجانبية

في حال حصول أيّ عارض مزعج أو غير عادي يجب استشارة الطبيب.

افدرين هيدروكلورايد: تسبب الجرعات العالية من الإفيدرين عصبية، أرقاً، دواراً صداعاً، تسرع في دقات القلب، خفقاناً وتعرقاً. ويصاب بعض المرضى بالغثيان، التقيؤ وقلة الشهوة للطعام. قد يحصل تشنج في مصرة المثانة ويسبب تبولاً صعباً ومؤملاً. قد يصاب الذكور الذين يعانون من عصبية بروتستاتية باحتباس بولي.

الكاربينوكسامين: قد تسبب مضادات الهستامين تسكيناً، دواراً، ازدواج البصر، تقيؤاً، إسهالاً، جفاف الفم، صداعاً، عصبية، غثياناً، قلة شهوة للطعام، حرقة القلب، ضعفاً، بوالاً، عسر تبول ونادراً استنارية لدى الأطفال. قد يصاب المرضى الذين يعانون من تضخم في البروستات باحتباس بولي. قد تسبب الأمينات مقلدات الودي اختلاجات وإثارة الجهاز العصبي المركزي، لانظمية قلبية، صعوبات في التنفس، زيادة سرعة القلب أو ضغط الدم، هلوسات، رعاشاً، عصبية، أرقاً، شحوباً وعسر تبول.

شروط الحزن

يحفظ في درجات حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ في العبوة الاساسية.

لا تستعمل الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

العبوة

يتوفر شراب السعال دولسانا في قوارير سعة ١٠٠ مل.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .

صنع في ذوق مصبح، لبنان، في معامل

الغوريم ش.م.ل.

م ماركة مسجلة