

دولسانا^٢ معتدل الفعالية شراب للسعال

التركيب

تحتوي كل ملعقة صغيرة (٥ مل) على :

١,٤٠٠٠ ملغم	كاربينيوكسامين ماليايت
١,٨٠٠ ملغم	افدرين هيدروكلورايد
٥٠,٤٠٠ ملغم	أمونيوم كلورايد
٢٠,٤٠٠ ملغم	صوديوم سترات
١٠,٤٠٠ ملغم	حمض الليمون
٠,١٢٥ ملغم	منثول
٠,٤٠٠٢٥ ملغم	ملون أصفر # 6 FD&C

مواد سواغة تكفي ل ٥ مل.
في شراب ذي نكهة لطيفة.

الأثر الطبي

إن شراب السعال دولسانا^٢ معتدل الفعالية مستحضر مُقَشِّع للسعال عند الأطفال، فعال، آمن ولذيذ الطعم.

كاربينيوكسامين ماليايت، عامل مضاد للهستامين ذو تأثير مخدر موضعي وذو خصائص مهدئة لطيفة .

افدرين هيدروكلورايد مزيل للاحتقان وموسع للشعب الرئوية .

يساعد كل من الأمونيوم كلورايد، الصوديوم سترات وحمض الليمون على حل وتمييع الإفرازات السمكية الزجة التي تصاحب عادة نزلات البرد الصدرية.

المنثول مهدئ، ملطف وذو تأثير موضعي طفيف مضاد للألم.

دواعي الاستعمال

شراب السعال دولسانا^٢ معتدل الفعالية يوصف كمُقَشِّع للسعال عند الأطفال لتخفيف السعال الناتج عن الحساسية أو الزكام، أو البرد أو الحالات الحادة من العدوى في الجهاز التنفسي العلوي.

مقدار الجرعة

الأطفال من سن ١٠ إلى ١٤ سنة: ملعقة أو ملعقتان صغيرتان ثلاث أو أربع مرات يوميا (٥-١ مل).

٦ إلى ٩ سنوات: ملعقة صغيرة (٥ مل) ثلاث أو أربع مرات يوميا.

لا يستعمل للأطفال ما دون ٦ سنوات من العمر.

موانع الاستعمال

افدرين هيدروكلورايد: الغلوكوما المغلقة الزاوية، ورم القواتم، التضخم الحاجزي القديم التناسق، علاج بميثيل أكسيداز أحادي الأمين بالتزامن أو مؤخراً (الإمام ال ١٤ السابقة)، تخدير عمومي بهيدروكربونات هالوجينية (بخاصة الهالوتان)، تسرع دقات القلب اللائظمي أو رجفان بطيني، فرط حساسية ضد الإيفيدرين أو منبهات أخرى.

الكاربينيوكسامين: فرط الضغط الحاد، مرض شرياني تاجي حاد والمرضى الذين يخضعون لعلاج بميثيل أكسيداز أحادي الأمين. المرضى المصابون بغلوكوما مغلقة الزاوية، باحتباس بولي، بقرحة هضمية وخلال نوبة ربو. المرضى المصابون بفرط حساسية ضد الكاربينيوكسامين.

تحذيرات

قد يكون السعال المتواصل إشارة إلى حالة خطيرة.

قد يسبب الإفدرين احتباسا بوليا.

يحتوي هذا المستحضر على مضاد هستامين ويمكن أن يسبب النعاس.

يجب استعمال الدواء بحذر لدى المرضى المصابين بفرط ضغط الدم، بمرض قلبي، بالربو، بفرط الدرقية، بزيادة الضغط داخل العين، بداء السكري أو بتضخم البروستات.

فرط الجرعة

عوارض فرط الجرعة:

في حال سيطرت تأثيرات مضاد الهستامين، يشكّل الفعل المركزي الخطر الأكبر. لدى الطفل الصغير، تكون العوارض الأساسية الإبرة، الهلوسات، الخلجان، عدم التنسيق، الرعاش، تورّد الوجه والحُمى. في الحالات الحادة قد تحصل اختلاجات وتبّات الحديقة أو توسّعها وسبات وحتى الوفاة. أما لدى البالغ، فتكون الحُمى والتورّد غير

شائعين؛ وغالباً ما يسبق الإبرة التي تؤدّي إلى اختلاجات وكآبة عقب نشبة نعاس و سبات. عادة لا يضعف التنفس بشكل خطير ويكون ضغط الدم ثابتاً. أما في حال سيطرت عوارض مقلدات الودي، فتتضمن التأثيرات المركزية تمللاً، دواراً، رعاشاً، ردات فعل مفرطة النشاط، ثرثرة، استثارية وأرقاً. تتضمن التأثيرات القلبية الوعائية والكلوية، صعوبة في التبول، صداعاً، تورّد، خفقاناً، لانظمية قلبية، فرط ضغط يليه نقص ضغط ووهط دورانج. وتتضمن التأثيرات المعدية المعوية جفاف الفم، طعماً معدنياً، قلة الشهوة للطعام، غثياناً، تقيؤاً، إسهالاً ومغصاً بطنياً.

التفاعلات الدوائية

الرجاء أن تعلم طبيبك بأيّ أدوية تأخذها بما فيها تلك التي تشتريها من دون وصفة طبية. **الافدرين:** لا ينبغي استعماله بالتزامن مع بعض مضادات الاكتئاب لا سيما ميثيلات إعادة امتصاص السيروتونين نورإبينيفرين لأن ذلك يزيد خطر التأثيرات الجانبية بسبب مستويات النورإبينيفرين المفرطة في المصل. **الحاصرات الأدرينالية الفعّل ألفا ، الأرويين، مدرّات البول.**

الكاربينيوكسامين: يمكن أن تزيد مضادات الهستامين من تأثيرات مضادات الاكتئاب الثلاثية الدورة، الباربيتورات، الكحول ومخففات الجهاز العصبي المركزي. إن ميثيلات الأكسيداز الأحادي الأمين تطوّل وتقوّي التأثيرات المضادة لإفراز الكولين لمضادات الهستامين. قد تخفّف الأمينات مقلدات الودي من التأثيرات المضادة لفرط ضغط الدم للريزربين، فلوإتات الفيراتروم، الميثيلدوبا والميكاميلامين. تزداد تأثيرات مقلدات الودي مع ميثيلات أكسيداز الأمين الأحادي والحاصرات الأدرينالية الفعّل بيتا.

الحمل والارضاع

إذا كنت حاملاً او مرضعة، الرجاء أن تستشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

التأثيرات الجانبية

يجب اعلام الطبيب في حال ظهور اي اعراض مزعجة او غير مألوفة .

افدرين هيدروكلورايد: تسبّب الجرعات العالية من الإفدرين عصبية، أرقاً، دواراً، صداعاً، تسرع في دقات القلب، خفقاناً وتوقفاً. ويصاب بعض المرضى بالغثيان، التقيؤ وفلة الشهوة للطعام. قد يحصل تشنج في مصرة المثانة ويسبب تبولاً صعباً ومؤلحاً. قد يصاب الذكور الذين يعانون من عصبية بروتستاتية باحتباس بولي.

الكاربينيوكسامين: قد تسبّب مضادات الهستامين تسكيناً، دواراً ازدواج البصر، تقيؤاً، إسهالاً، جفاف الفم، صداعاً، عصبية، غثياناً، قلة شهوة للطعام، حرقة القلب، ضعفاً، بوالاً، عسر تبول ونادراً استثنائية لدى الأطفال. قد يصاب المرضى الذين يعانون من تضخم في البروستات باحتباس بولي. قد تسبّب الأمينات مقلدات الودي اختلاجات، إثارة الجهاز العصبي المركزي ولانظمية قلبية، صعوبات في التنفس، زيادة سرعة دقات القلب أو ضغط الدم، هلوسات، رعاشاً، عصبية، أرقاً، شحوباً وعسر تبول.

شروط التخزين

يحفظ في درجات حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.

يحفظ في العبوة الاساسية.

لا تستعمل الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

العبوة

يتوفر شراب السعال دولسانا^٢ معتدل الفعالية في قوارير سعة ١٠٠ مل.

إن هذا الدواء

- مستحضر يؤدّر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

صنع في ذوق مصبح، لبنان، في معامل

الصغوريتيم ش.م.ل.

٢ ماركة مسجلة