

## رستروبينال ٣ نقط للأطفال

رستروبينال ٣ مركب خاص لإزالة أعراض التشنج المعدي المعوي عند الرضع والاطفال .

### التركيب

كل ١ مل (٢٠ نقطة) يحتوي على :

ميثسكوبولامين نترات ..... ٠,١ ملغم  
بوتابريبتال (أسيد) ..... ٢,٠ ملغم

### الأثر الطبي

**مضاد للتشنج** : يتميز ميثسكوبولامين نترات بتأثير قوي وسريع . إنه أكثر فعالية وأسرع تأثيراً من الأتروبين او المثيل أتروبين مع المزايا التالية :

- فعالية مضادة للكولين
- عدم وجود التأثيرات المركزية للسكوبولامين لان هذا الدواء لا يجتاز الحاجز الدموي الدماغي .
- تأثير مضاد للتشنج أكثر إنتقائية على العضلات للمساء .
- غياب التأثيرات السمية او تسرع القلب بالجرعات العادية .
- **مهدى** : ينتمي البوتابريبتال (أسيد) الى مجموعة البريبينورات متوسطة مدة الفعالية . جرعة صغيرة منه تعطي تأثيراً مهدئاً لطيفاً للطفل المتألم .

### دواعي الاستعمال

الحالات التشنجية في الجهاز المعدي المعوي كالمغص المعوي ، التشنج البوابي ، التضيق البوابي الناتج عن التضخم ، الغثيان والتقيؤ الوظيفيان .

### مقدار الجرعة

يعطى قبل كل وجبة خمس - ست مرات يومياً .  
من الميلاد - سنة واحدة : نقطتان / كغم من وزن الجسم ٥ - ٦ مرات يومياً .  
سنة واحدة - سنتين : نصف ملعقة صغيرة ٥ - ٦ مرات يومياً .  
سنتان - ست سنوات : ملعقة صغيرة واحدة ٥ - ٦ مرات يومياً .

### موانع الاستعمال

الزرق وإضطراب نظم القلب .

### الأعراض الجانبية

عند تجاوز الجرعة الموصى بها ، ولدى تناول بعض المرضى الجرعات العلاجية المتوسطة ، قد يحدث واحد او اكثر من الاعراض الجانبية التالية مما يستدعي إنقاص الجرعة : جفاف الفم ، تشوش الرؤية ، الإمساك ، الصعوبة في بدء التبول ، الضعف العام ، الصداع ، النعاس ، وبطء النبض . في حال ظهور اي عارض غير عادي يجب إستشارة الطبيب .

### تحذيرات

- يجب عدم إستعمال قطرات رستروبينال ٣ للأطفال في حال وجود إنسداد عضوي في الجهاز المعدي المعوي .
- يجب عدم تجاوز الجرعة المقررة .

### العبوة

نقاط رستروبينال للأطفال متوفرة في قوارير سعة ٢٥ مل مع قطارة مدرجة .  
كل ٢٠ نقطة من القطارة المدرجة تعادل ١ مل .

### شروط الخزن

يحفظ من الضوء في مكان غير رطب ودرجات حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية . لا يحفظ في الثلاجة  
لا تستعمل الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية .  
يجب صرف الدواء فقط بوصفة طبيب .

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .

صنع في ذوق مصبح في معامل الغوريتم ش.م.ل .

٣ ماركة مسجلة