

Mephigastryl

Composition

Chaque capsule contient:	
Prochlorpérazine dimaléate	10 mg
Méprobamate	100 mg
Magnésium oxyde	100 mg
Belladone poudre	5 mg

Propriétés

L'action spasmolytique, anticholinergique, tranquilisante et antacide du Mephigastryl le destine au traitement de divers troubles gastro-intestinaux.

La *Prochlorpérazine* est un dérivé de la phénothiazine possédant plusieurs actions pharmacodynamiques. Parmi ses propriétés thérapeutiques citons principalement ses actions anti-émétique et antihistaminique. Le *Méprobamate* possède une action relaxante et tranquilisante. L'*Oxyde de Magnésium* est un antacide de valeur et un laxatif moyen, dont l'effet tampon équilibre le pH gastrique. La *Belladone* est un antispasmodique ayant une action privilégiée sur les muscles lisses abdominaux. Elle diminue aussi l'hypersécrétion gastrique.

Indications

Hyperacidité, ulcères gastrique et duodénal.
États spastiques d'origine fonctionnelle et

organique associés à l'anxiété et à la tension nerveuse. Hyperexcitabilité, hypermotilité et spasme du tractus gastro-intestinal et biliaire. Indigestion d'origine nerveuse, dyspepsie, gonflement, flatulence, nausée et vomissement, gastrite, colite, cholécystite et pylorospasme. Constipation spastique et diverticulose.

Effets secondaires

Du fait que les différents composants du Mephigastryl se potentialisent, il a été possible de réduire leur dosage au minimum, évitant ainsi tout risque de réactions toxiques sans pour autant entraver l'efficacité du produit. Cependant on a observé très rarement de la somnolence chez certains patients.

Remarques

Ne pas dépasser la dose prescrite.
Si le Mephigastryl est, en particulier, administré à des doses supérieures à la normale, il pourrait perturber l'état de vigilance des malades, p. ex. les conducteurs de voiture. Comme c'est le cas avec les médicaments en général, il est conseillé de ne pas utiliser le produit durant les trois premiers mois de la grossesse.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un de ses composants ainsi qu'en présence de glaucome, d'hypertrophie de la prostate, dans la myocardite aiguë, la tachycardie et dans l'épilepsie.

Posologie

Sauf avis contraire du médecin, une capsule trois fois par jour, après les repas.

Présentation

Boîte de 20 capsules.

Médicament: tenir hors de la portée des enfants