

كبولات .

اندوميل

اندوميثاسين.

ان منحصر اندوميل (اندوميثاسين) هو علاج غير سنارويدي فعال جدا مضاد للالتهابات يمنع بحواسر واصحفة في كمين الالام وتخفيف الحرارة. أما كيفية تأدية مفعوله فهي غير معروفة كما الحال مع سائر العقاقير المضادة للالتهابات. الا ان أثره الطسي ليس ناجما عن اثاره الكظر او الفدة النعامة. ان منحصر اندوميل ليس مكننا عاذاها سيطا لفلت يجب حصر استعماله الاصابات المذكورة تحت الحالات التي يتصل فيها الدواء، وخاصة الحالات التي لا تنجب للتدابير التقليدية المحافظة.

يخفف اندوميل امراض المرضى. انه يخفف الالم، ويخفض الحرارة، والانتفاخ، والمضض ان هذا المنحصر كسائر العقاقير المضادة الالتهابات، لا يغير مجرى المرض السبب.

الحالات التي يتصل فيها الدواء:

يوصف منحصر اندوميل في المراحل الحادة للحالات التالية:

- التهاب المفاصل الشبية بالروماتزمي.

- الالتهاب العظمي المفصلي.

- التهاب المفصل المتردي في الورك.

- التهاب الصلب الاقط.

- داء النقرس.

- الاضطرابات العظمية الصلبة الحادة، كالتهاب الاكياس الزلالية، والتهاب الاوتار، والتهاب اعضاء المصلي، والتهاب غمد الوتر، والتهاب محفظة الكف. كما يوصف أيضا في الحالات التالية:

- الالم الظهر الاسفل (المعروف عادة بالالم الصلب)

- الحمى (لفترة قصيرة كدواء اضافي للعلاجات النوعية)

- الالم، والالتهاب، والضرز، والارثما التي تعقب المراحة في الاسنان.

نبدأ المعالجة باستعمال ٢٥ ملليجرام مرتين او ثلاث مرات يوميا. فاذا لم يحدث التحارب المناسب للعلاج، تزداد الجرعات تدريجيا على دفعات مقدارها ٢٥ ملليجرام طبقا لحاجة المريض. وغالبا ما يحدث التجاوب المناسب للعلاج عند استعمال عدد من الجرعات مجموعها ١٥٠ ملليجرام في اليوم او اقل ونادرا ما تقضى الحاجة الى زيادة عدد الجرعات عن ٢٠٠ ملليجرام في اليوم.

الاعتبارات الاخرى لتحديد مقدار الجرعة.

ان بعض المرضى قد يحتاج الى عدد من الجرعات مجموعها ١٥٠ الى ٢٠٠ ملليجرام في اليوم للتحكم الصريح في امراض المرضى، الا انه يمكن في أغلب الاحيان تخفيض مقدار الجرعات تدريجيا حتى يصل الى ٧٠ - ١٠٠ ملليجرام في اليوم بصورة سنرة. ونادرا ما تقضى الحاجة الى زيادة عدد الجرعات عن ٢٠٠ ملليجرام في اليوم (عند زيادة مقدار الجرعات ليصل الى هذا الحد او لصل أكثر من ذلك، تزداد نسبة ظهور الاعراض الحساسية، وخاصة الصداع والاضطرابات المعدة المعوية التي قد تحدث وتستوجب تخفيض مقدار الجرعات بصورة مؤقتة).

التحول من المالحه باتركبات الاخرى المضادة للالتهاب الـ منحضر اندوميل:
١ - السلبات: عندما يتم التجاوب لمنحضر اندوميل، يمكن عادة
تحفيض مقدار الجرعات اليومية من السلبات. كما يمكن التوقف عن
استعمالها في أغلب الاحيان.

٢ - الساروهدات: اذا كان المرضى يتناولون الساروهدات الفشرية، يمكن
في أغلب الاحيان تحفيض مقدار الجرعات تدريجيا ٢٥ - ٥٠ بالمئة. كما يمكن
التوقف عن استعمال الساروهدات تدريجيا عند بعض المرضى عن كسب
لا احتمال ظهور ردود فعل معاكسة نتيجة لسحب الساروهدات من المعالجة.

٣ - البيرازولونات - يمكن استبدال البيرازولونات بمنحضر اندوميل،
وعندما تزداد الجرعات من اندوميل تدريجيا حتى تصل الـ المنشوى الفعال،
يجب تحفيض مقدار الجرعة من مركب البيرازولون ثم التوقف عن استعماله.

الاعراض الحامية:

- ردود الفعل المعده المعوية: الغثبان، قلة الشهية للطعام، التقيؤ، الالم في أغشية
المعدة، الالم البطني، الاسهال، التقرح --- المنفرد أو المتعدد -- في المريء، او
المعدة، أو الأنتى عشر، أو الامعاء الدقيقة.
- ردود الفعل الكبدية: اليرقان والتهاب الكبد.
- ردود الفعل الجلدية الناتجة عن فوط الحساسية: الحكه، الشرى، والاردمما
الرعاية المعصية.

المصرة:

- كيسول في رجاحة سعة ٣٠ كيسولة ٢٥ ملغ.
- تحاميل عبوة خمسة تحاميل ١٠٠ ملغ.