

كبسولات اندوميل اندوميثاسين.

ان مستحضر اندوميل (اندوميثاسين) هو علاج غير ستارويدي فعال جدا مضاد للالتهابات يتمتع بخواص واضحة في تسكين الالام وتخفيض الحرارة. أما كيفية تأدية مفعوله فهي غير معروفة كما الحال مع سائر العقاقير المضادة للالتهابات. الا ان أثره الطبي ليس ناتجا عن اثارة الكظر او الغدة النخامية. ان مستحضر اندوميل ليس مكننا عاديا بسيطا لذلك يجب حصر استعماله الاصابات المذكورة تحت "الحالات التي يستعمل فيها الدواء"، وخاصة الحالات التي لا تستجيب للتدابير التقليدية المحافظة.

يخفف اندوميل اعراض المرض. انه يخفف الالم، ويخفض الحرارة، والانتفاخ، والمضض ان هذا المستحضر كسائر العقاقير المضادة الالتهابات، لا يغير مجرى المرض المسبب.

الحالات التي يستعمل فيها الدواء:

يوصف مستحضر اندوميل في المراحل الحادة للحالات التالية:

- التهاب المفاصل الشبيه بالروماتزمي.

- التهاب العظمي المفصلي.

- التهاب المفصل المتردي في الورك.

- التهاب الصلب الاقسط.

- داء النقرس.

- الاضطرابات العضلية العصبية الحادة، كالتهاب الاكياس الزلالية، والتهاب الاوتار، والتهاب الغشاء المصلي، والتهاب غمد الوتر، والتهاب محفظة الكتف. كما يوصف أيضا في الحالات التالية:

- الم الظهر الاسفل (المعروف عادة بآلم الصلب)

- الحمى (لفترة قصيرة كدواء اضافي للعلاجات النوعية)

- الالم، والالتهاب، والضرز، والادما التي تعقب الجراحة في الاسنان.

تبدأ المعالجة باستعمال ٢٥ ملليجرام مرتين او ثلاث مرات يوميا. فاذا لم يحدث التجاوب المناسب للعلاج، تزداد الجرعات تدريجيا على دفعات مقدارها ٢٥ ملليجرام طبقا لحاجة المريض. وغالبا ما يحدث التجاوب المناسب للعلاج عند استعمال عدد من الجرعات مجموعها ١٥٠ ملليجرام في اليوم او أقل ونادرا ما تقضي الحاجة الى زيادة عدد الجرعات عن ٢٠٠ ملليجرام في اليوم.

الاعتبارات الاخرى لتحديد مقدار الجرعة.

ان بعض المرضى قد يحتاج الى عدد من الجرعات مجموعها ١٥٠ الى ٢٠٠ ملليجرام في اليوم للتحكم الصحيح في اعراض المرض، الا انه يمكن في أغلب الاحيان تخفيض مقدار الجرعات تدريجيا حتى يصل الى ٧٠ - ١٠٠ ملليجرام في اليوم بصورة مستمرة. ونادرا ما تقضي الحاجة الى زيادة عدد الجرعات عن ٢٠٠ ملليجرام في اليوم (عند زيادة مقدار الجرعات ليصل الى هذا الحد او ليصل أكثر من ذلك، تزداد نسبة ظهور الاعراض الجانبية، وخاصة الصداع والاضطرابات المعدية المعوية التي قد تحدث وتستوجب تخفيض مقدار الجرعات بصورة مؤقتة).

التحول من المعالجة بالتركبات الاخرى المضادة للالتهاب الى مستحضر اندوميل:
١ - السليسلات: عندما يتم التجاوب لمستحضر اندوميل، يمكن عادة تخفيض مقدار الجرعات اليومية من السليسلات كما يمكن التوقف عن استعمالها في أغلب الاحيان.

٢ - الستارويدات: اذا كان المرضى يتناولون الستارويدات القشرية، يمكن في أغلب الاحيان تخفيض مقدار الجرعات تدريجيا ٢٥ - ٥٠ بالمئة. كما يمكن التوقف عن استعمال الستارويدات تدريجيا عند بعض المرضى عن كتب لاحتمال ظهور ردود فعل معاكسة نتيجة لسحب الستارويدات من المعالجة.
٣ - البرازولونات - يمكن استبدال البرازولونات بمستحضر اندوميل، وعندما تزداد الجرعات من اندوميل تدريجيا حتى تصل الى المستوى الفعال، يجب تخفيض مقدار الجرعة من مركب البرازولون ثم التوقف عن استعماله.

الاعراض الجانبية:

- ردود الفعل المعدية المعوية: الغثيان، قلة الشهية للطعام، التقيؤ، الالم في أغشية المعدة، الالم البطني، الاسهال، التقرح --- المفرد أو المتعدد --- في المريء، او المعدة، أو الاثنى عشر، أو الامعاء الدقيقة.
- ردود الفعل الكبدية: اليرقان والتهاب الكبد.
- ردود الفعل الجلدية الناتجة عن فوط الحساسية: الحكة، الشرى، والاورديما الوعائية العصبية.

العبرة:

- كبسول في زجاجة سعة ٣٠ كبسولة ٢٥ ملغ.
- تحاميل عبوة خمسة تحاميل ١٠٠ ملغ.