

ميكوتال

منتج من كربويسيتين (وفقاً لدستور الأدوية الأوروبية)

مذيب للبلغم

الوصف

يحتوي **ميكوتال للكبار** على ٢٥٠ ملغ من كربويسيتين في كل ٥ ملل من السائل
يحتوي **ميكوتال للأطفال** على ١٠٠ ملغ من الكاربويسيتين في كل ٥ ملل من السائل

خصائص الدواء الإكلينيكية

إن الكاربويسيتين عامل حال للبلغم. يفعل فعله على المرحلة الهلامية من البلغم ربما من خلال خرق
جسور ثنائي السلفيد للبروتين السكري، مما يسهل تصريف البلغم. ومن شأن هذا الدواء أن يُرخي
إفرازات الشعب الهوائية مما يسمح بتصريف البلغم بسهولة أكبر من خلال السعال.

دواعي الاستعمال

إن الكاربويسيتين عامل حال للبلغم يساعد على علاج اضطرابات جهاز التنفس الذي يتميز ببلغم مفرط
ولزج وكذلك على علاج الداء المزمن الساد للمناظف الهواء.

الجرعة وإعطاؤها

ميكوتال للكبار

للراشدين فقط (الذين يتجاوز عمرهم الخمس عشرة سنة): ملعقة كبيرة (١٥ ملل) صباحاً، وفي منتصف
النهار ومساءً تؤخذ بعيداً عن وجبات الطعام من دون تجاوز ثلاث جرعات باليوم.

فترة العلاج: محدودة بخمسة أيام

ميكوتال للأطفال

للأطفال من عمر الستين إلى ٥ سنوات: ملعقة صغيرة (٥ ملل) مرتين باليوم.

للأطفال من عمر ٥ سنوات وما فوق: ملعقة صغيرة ثلاث مرات باليوم.

فترة العلاج: ممنوع تناوله لفترة تمتد أكثر من ٨ إلى ١٠ أيام من دون استشارة الطبيب.

طريقة التناول: عن طريق الفم

الآثار الجانبية

انزعاج في المعدة، غثيان، إسهال.

في حال حصول هذه الأعراض، ينصح بتخفيف الجرعة.

تم إحيانا الإبلاغ عن حصول نزيف في الجهاز الهضمي وطفح جلدي وردود فعل تحسسية

تفاعل الأدوية

لا يوجد أي تفاعلات معروفة للكاربويسيتين مع أدوية أخرى.

لتفادي التفاعلات المحتملة بين العديد من الأدوية، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل عام عن أي علاج
يخضع له المريض في الوقت نفسه.

موانع الاستعمال

ميكوتال للكبار

لدى الأطفال ما دون سن ١٥ سنة

الحساسية المفرطة على مادة فعالة أو على أي من المواد المكونة لهذا الدواء

تقرح فعال في جهاز الهضم

ميكوتال للأطفال

لدى الأطفال ما دون سن الستين

الحساسية المفرطة على مادة فعالة أو على أي من الماد المكونة لهذا الدواء.

التحذيرات

من الضروري استشارة الطبيب

في حال وجود بصاق سميك وممتنع، أو حمى

إذا كنت تعاني من اضطراب مزمن (طويل الأمد) في الشعبات أو الرئتين

إذا كنت تعاني من قرحة في المعدة أو الأمعاء الاثني عشر

يجب أن يتراقف استخدام هذا الدواء أيضاً مع بذل مجهود إرادي للسعال وبالتالي السماح بالتحلص من
البلغم

ممنوع تناول دواء مضاد للسعال أو دواء يجفف إفرازات الشعب خلال فترة العلاج مع كاربويسيتين

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا يُنصح باستعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول للحمل.

الإرضاع: يتم إفراز هذا الدواء في حليب الرضاعة. ممنوع تناول هذا الدواء في حال كنتِ تقومين
بالإرضاع.

الجرعة المفرطة

في حال تناول جرعة مفرطة، يجب توقيف العلاج واستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

الأشكال الصيدلانية المتوفرة

شراب للبالغين: زجاجات سعة ١٥٠ ملتر: تحتوي في كل ٥ ملتر (ملعقة صغيرة) على كربويسيتين
٢٥٠ ملغ وسواغ كمية كافية ل ٥ ملتر.

رقم التسجيل لبنان ٢٧٨٠٧/٩٤

شراب للأطفال: زجاجات سعة ١٥٠ ملتر: تحتوي في كل ٥ ملتر (ملعقة صغيرة) على كربويسيتين
١٠٠ ملغ وسواغ كمية كافية ل ٥ ملتر.

رقم التسجيل لبنان ٢٧٨٠٨/٩٤

إحفظ الدواء على درجة حرارة ما دون ٢٥ درجة مئوية بعيداً عن النور والرطوبة.

إحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تستعمل الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على الظرف والعلبة الخارجية.

يُصرف فقط بناء على وصفة طبيب.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحّتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

فارمابين - لبنان

إن إسم ميكوتال هو ماركة مسجلة