

**نشرة الدواء: معلومات للمريض**

# موسيرول اكسترا أقراص

باراسيتامول ٤٥٠ ملغم، أورفينادرين سيترات ٣٥ ملغ و كافيين ١٥ ملغ

**إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

– إحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً.

– في حال وجود أي تساؤلات لديك، يُفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.

– لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، ولا ينبغي بك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

– إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي، مراجعة القسم ٤.

**ما الذي تحتويه هذه النشرة**

١– ما هو موسيرول اكسترا و ما هي دواعي إستعماله

٢– ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول موسيرول اكسترا

٣– ما هي طريقة تناول موسيرول اكسترا

٤– الأعراض الجانبية المحتملة

٥– طريقة تخزين موسيرول اكسترا

٦– محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

**١. ما هو موسيرول اكسترا و ما هي دواعي إستعماله**

يحتوي هذا الدواء على الباراسيتامول، الأورفينادرين سيترات و الكافيين.

يستعمل الباراسيتامول لعلاج أو لتفادي الألم وتخفيف الحرارة.

يوفر الأورفينادرين سيترات الراحة الفعالة لبعضلات الهيكل العظمي. يؤثر على الجهاز العصبي المركزي لإنتاج آثار إسترخاء في العضلات.

قد يساعد الكافيين في زيادة تأثير الباراسيتامول على تسكين الألم، لقد تم إضافته إلى هذا الدواء بكمية قليلة للحد من الآثار الجانبية المحتملة مثل العصبية و حدة الطبع و تسارع دقات القلب في بعض الأحيان.

تستعمل أقراص موسيرول اكسترا لعلاج الصداع الناتج عن التوتر و أوجاع الرأس الناتجة عن التشنج في العضلات في الجهة الخلفية من رأسك وعنقك، وتستخدم كذلك لإراحة بعض عضلات جسمك للتخفيف من الألم والإنزعاج الناتج عن لتواء المفاصل، الشد العضلي أو الإصابات الأخرى في عضلاتك.

**٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول موسيرول اكسترا**

**لا تتناول موسيرول اكسترا:**

– إذا كان لديك حساسية (حساسية شديدة) للباراسيتامول، للأورفينادرين سيترات، للكافيين أو أي أدوية أخرى مشابهة، أو أي من مكونات هذا الدواء (واردة في القسم٦).

– إذا كنت تعاني من ضغط عال في العين (الغلوكوما - الماء الأزرق).

– إذا كنت تعاني من انسداد معوي أو مرض في المريء.

– إذا كنت تعاني من تضخم في البروستات أو إنسداد المثانة.

– إذا كان لديك مرض في عضلاتك يدعى مياسيتينيا غرافيس (الوهن العضلي الوبيل) الذي يتسبب بسقوط الجفون، الرؤية المزدوجة، الصعوبة في النطق والبلع وأحياناً ضعف في عضلات الذراعين أو الساقين.

**التحذيرات والإحتياطات:**

تحدث الى طبيبك أو إلى الصيدلي قبل تناول موسيرول اكسترا:

– إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي أدوية أخرى ، أطعمة، مواد حافظة أو ملونات.

– إذا كنت تعاني من أي مشاكل في القلب.

– إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.

– إذا كان لديك مشاكل في تناول الكحول المفرط.

– إذا كنت تتناول منتجات أخرى تحتوي على الباراسيتامول.

– إذا كنت تتناول أدوية و أطعمة و منسوجات أخرى تحتوي على مادة الكافيين.

**الأطفال والمراهقون:**

لا تعطِ هذا الدواء للأطفال ما دون ١٢ سنة لأنّه لم يتمّ الثبّت من سلامته وفعاليتّه.

**الأدوية الأخرى وموسيرول اكسترا:**

أبلغ الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما فيها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

**وبصورة خاصة:**

– مضادات إفراز الكولين (أدوية تستخدم للتخفيف من ألم مغص المعدة والتشنجات).

– الأدوية المستخدمة لعلاج الكآبة.

– الأدوية المثبطة للجهاز العصبي المركزي، بما فيها الكحول.

أمثلة على مِثبطات الجهاز العصبي المركزي، مضادات الهيستامين او أدوية حمّى القش، حساسيات أخرى أو الزكام، مسكنات أو مهدئات، مسكنات مخدرة (مثلاً دكسترو بروبوكسيفين)، الباربيتورات، أدوية النوبات، المخدرات (البنج) بما فيه بعض أنواع البنج الخاص بطب الأسنان وغيرها من المرخيات العضلية.

– الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع أو النوبات.

– الأدوية المستخدمة لمنع تجلطات الدم.

– الأدوية التي تؤثر على إفراغ المعدة مثلاً الميتوكلوراميد.

– الكلورامفينيكول و هو مضاد حيوي.

يمكن أن تحتاج إلى كميات مختلفة من أوبيتك أو يمكن ان تحتاج الى تناول أدوية مختلفة. لدى طبيبك أو الصيدلي مزيد من المعلومات حول الأدوية التي يجب توخي الحذر معها أو تجنبها أثناء تناول موسيرول اكسترا.

**موسيرول اكسترا مع المشروبات والكحول:**

يجب عدم شرب الكحول عند تناول هذا الدواء.

تفادي الكثير من الكافيين في المشروبات مثل القهوة و الشاي، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين الى صعوبة في النوم، الرجفان و زيادة ضربات القلب.

**الحمل والرضاعة:**

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك، تعتقدن أنك حامل أو تودين إنجاب طفل، استشيري الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الحمل أو الرضاعة.

سيناقش طبيبك أو الصيدلي المخاطر والفوائد المحتملة لإستخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

**القيادة واستخدام الآلات:**

كن حذراً في القيادة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك، يمكن ان يسبب موسيرول اكسترا لبعض الناس بغشاوة في الرؤية أو العباس، تشويش الذهن، الدوار، الإغماء، أو ببقظة أقل ممّا هي عادة، يمكن أن يسبب ذلك بضعف في العضلات لدى بعض الناس. إذا كان لديك أي من هذه العوارض لا تقد أو تشغل ألية أو تقوم بأي شيءٍ آخريمكن أن يكون خطراً.

**٣. ما هي طريقة تناول موسيرول اكسترا**

إتبع إرشادات الطبيب المعالج بدقة عند تناول هذا الدواء وإستشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا لست متأكّداً.

الجرعة الموصى بها للبالغين هي قرصان ثلاث مرات يومياً.

**إذا تناولت موسيرول اكسترا بكمية أكبر مما ينبغي عليك**

يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة من الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول إلى خطر تلف الكبد.

إذا كنت قد أخذت من هذا الدواء أكثر مما ينبغي، توقف عن تناوله و اتصل بطبيبك فوراً حتى ولو كنت في حالة جيدة.

يمكن أن تحتاج الى عناية طبية عاجلة.

قد تواجه أعراض الجرعة الزائدة التي تشمل: ألم في البطن، التقيؤ، التعرق المتزايد، حمول حاد، صعوبة في التنفس، إزرقاق لون البشرة أو الأغشية المخاطية التي عادة ما تكون بسبب نقص الأوكسجين في الدم (زراق)، الإثارة، الإرتباك، إرتباك شديد يؤدي إلى غيبوبة، الإختلاجات، سرعة في معدل ضربات القلب، تمدد في حذقتي العين وصعوبة في التبول.

**إذا نسيت تناول موسيرول اكسترا**

إذا نسيت تناول جرعة من هذا الدواء وتذكرت في غضون ساعة أو نحو ذلك من الجرعة التي نسيتها، تناولها فوراً.

إذا لم تتذكر حتى وقت متأخر، تجاوز الجرعة المنسية وتناول الجرعة الموصى بها في الوقت المعتاد.

يجب عدم تناول جرعة مزدوجة من أجل التعويض عن الجرعة المفقودة.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول إستخدام هذا الدواء إسأل طبيبك أو الصيدلي.

**٤. الأعراض الجانبية المحتملة**

قد ينتج عن هذا الدواء وكذلك باقي الأدوية، آثاراً جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع.

تحدث الى طبيبك إذا واجهت أي من الأعراض الجانبية التالية:

أقل شيوعاً: نقص في التبول، ألم في العين، إغماء، سرعة أوخفقان شديد في ضربات القلب.

نادراً: هلوسة، ضيق في التنفس، تنفس مضطرب، ضيق في الصدر و/أو صفير في التنفس، طفح جلدي، قروح، تقرحات أو بقع بيضاء على الشفتين أو على الفم، غدد منتفخة و/أو مؤلمة، كدمات غير عادية أو نزيف، إرهاق أو ضعف غير عادي.

لا تحتاج العوارض الجانبية التالية عادة الى عناية طبية ويمكن أن نزول خلال العلاج عندما يتكيف جسدك مع العلاج، تحدث إلى طبيبك إذا استمرت أي من الآثار الجانبية التالية أو كانت مزعجة:

الأكثر شيوعاً: الفم الجاف.

الأقل شيوعاً أو نادراً: تشنجات أو ألم في البطن، غشاوة أو رؤية مزدوجة، الارتباك، الإمساك، الصعوبة في التبول، دوخة أو خفة في الرأس، إثارة، عسر الهضم، الإنفعال المفرط، الغثيان، الإهتياج العصبي أو عدم الراحة، الصداع، ضعف العضلات، توسع غير عادي لحذقتي العينين.

**الإبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا واجهت أي آثار جانبية بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي، من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**٥. طريقة تخزين موسيرول اكسترا**

– قم بتخزين هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

– لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية والمذكور على الشريط الداخلي و العبوة الخارجية، يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.

– لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية، إحفظه بعيداً عن الرطوبة.

– لا تقم باستعمال هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.

– لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف الصحي، إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

**٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى**

**على ماذا يحتوي موسيرول اكسترا**

– المواد الفعالة هي الباراسيتامول، الأورفينادرين سيترات و الكافيين.

يحتوي كل قرص على ٤٥٠ ملغ من الباراسيتامول و ٣٥ ملغ من الأورفينادرين سيترات و ١٥ ملغ من الكافيين.

– المكونات الأخرى هي :

ميكروكريستالين سيلولوز، نشاء الذرة، ستيرات المغنيزيوم، سيليكأ غروية لا مائية، كروسكارميلوز الصوديوم، بوفيدون و حمض الستياريك.

**كيف يبدو شكل موسيرول اكسترا و ما هي محتويات العبوة**

إن أقراص موسيرول اكسترا هي أقراص بيضاء، مستطيلة و منبسطة الشكل.

يتوفر موسيرول اكسترا في عبب تحتوي الواحدة على ٢٠ قرصاً.

**الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق**

فارمالين ش.م.ل - لبنان

الصندوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

للتواصل معنا: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل موسيرول اكسترا : ٤/١٩٤٧٥٢

**إن هذا الدواء:**

– يحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً

– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

– الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي وضعه وضرره.

– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

– لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

– لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب

**تمت مراجعة هذه النشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١**