

دليل استخدام الدواء: معلومات مخصصة للمريض
أسمالات شراب ٢ ملخ ٥ ملل
سايلو قامول سلفات

يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل بدقة قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- على المريض الاحتياط بهذا الدليل إذ قد يحتاج إلى قرائته مرة أخرى.

- إذا كانت هذه الدواء تماماً كما قال لك طبيبك، استشر طبيبك إذا لم تكن متاكداً.

تناول هذا الدواء

- استعمل ملقة البلاستيك ٥ ملل الموجودة مع الدواء لتناول الشراب.

- حضن جداً قبل الاستعمال.

- ٢٥٠ مل من الشراب بتراكيزه الحالي يعطيك جرعة من ١ مل و ٥ ملل تعطيك جرعة من ٢ مل من الساليوتاومول.

في هذا الدليل:

١. ما هو شراب أسمالات وما هي استعمالاته.

٢. ما تحتاج إلى معرفة قبل تناول شراب أسمالات.

٣. كيف تتناول شراب أسمالات.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة.

٥. كيفية تخزين شراب أسمالات.

٦. محتويات العلبة وغيرها من المعلومات.

١. ما هو شراب أسمالات وما استعمالاته

يحتوي شراب أسمالات على دواء يدعى ساليوتاومول. يعود هذا إلى مجموعة من الأدوية تدعى مفتوحة: هنا يحمل دخول وخروج الهواء أسلوب.

٢. ماذا تحتاج إلى معرفته وأنت تتناول شراب أسمالات:

٣. لا تتناول شراب أسمالات:

٤. إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) على ساليوتاومول سلفات أو أي مكونات أخرى من شراب أسمالات (واردة في القسم ٦)

٥. إذا كنت مصاباً بالسكري

٦. إذا كان لديك غدة درقية مفرطة النشاط أو التهاب الغدة الدرقية

٧. إذا كان لديك مشاكل في قلبك كعدم الانتظام أو السرعة في ضربات القلب أو التهاب القلب

٨. إذا كان أي مادة ينطبق عليك استشر طبيبك أو الصيدلي.

أدوية أخرى وشراب أسمالات

٩. وبصورة خاصة أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

١٠. أدوية بعدم انتظام وسرعة ضربات القلب.

١١. أدوية أخرى لمعالجة الريو.

١٢. شراب أسمالات مع الطعام والشراب

١٣. يمكنأخذ هذا الدواء مع أو بدون طعام في أي وقت من اليوم.

الحمل والرضاعة

١٤. إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فتكررين بأنه يمكن أن تكوني حاملاً أو تخطفين لأن يكون لديك طفل، استشيري طبيبك أو الصيدلي كصحية قبلأخذ هذا الدواء.

١. القيادة واستعمال الآلات

يبدو أنه من غير المحتمل أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك في القيادة أو استعمال العدة أو الآلات.

٢. كيف تتناول شراب أسمالات

تناول داماً هذا الدواء تماماً كما قال لك طبيبك. استشر طبيبك إذا لم تكن متاكداً.

٣. تناول هذا الدواء

- استعمل ملقة البلاستيك ٥ ملل الموجودة مع الدواء لتناول الشراب.

- حضن جداً قبل الاستعمال.

- ٢٥٠ مل من الشراب بتراكيزه الحالي يعطيك جرعة من ١ مل و ٥ ملل تعطيك جرعة من ٢ مل من الساليوتاومول.

٤. الأطفال بين ٢ و ٦ سنوات

- الجرعة المعتادة هي من ٢٥٠ مل إلى ٥ ملل (نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة كاملة)،

ثلاث أو أربع مرات يومياً.

٥. الأطفال بين ٦ سنوات و ١٢ سنة

- الجرعة المعتادة هي ٥ ملل (ملعقة صغيرة من ثلاثة إلى أربع مرات يومياً).

٦. الأولاد فوق ١٢ سنة

- الجرعة المعتادة هي من ٥ ملل إلى ١٠ ملل (ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين)، ثلاث أو أربع مرات يومياً.

٧. الراشدون (فوق ١٨ سنة)

- تناول هذا الدواء من ٥ ملل إلى ٢٠ ملل (ملعقة صغيرة إلى أربعة ملاعق صغيرة حتى أربع مرات يومياً).

٨. المستون (فوق ٦٥ سنة)

- إذا تناولت أكثر مما يحب، استشر طبيبك فوراً.

٩. يمكن حدوث آثار جانبية تالية:

- تناول شراب أسمالات على الأقل أكثر من المعتاد.

١٠. تشعر بغير عادة تناول هذه الوراثة عادة في ساعات قليلة.

١١. إذا نسيت تناول شراب أسمالات

إذا نسيت تناول شراب أسمالات تأخذ جرعة، تناولها حالما تذكر وتناول الجرعة القادمة في وقتها المحدد، إذا كان ذلك الوقت هو الوقت الذي تناول جرعتك القديمة. لا تأخذ الجرعة التي قد نسيتها، لا تتناول جرعة مزدوجة لتنسيب عن جرعة قد نسيتها.

١٢. إذا توقفت عن تناول شراب أسمالات

إذا توقفت عن تناول هذا الدواء دون استثناء طبيبك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء استشر طبيبك أو الصيدلي.

١٣. الآثار الجانبية المحتملة

مثل كحة الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء بأثار جانبية، مع ذلك فهي لا تحدث للجميع. يمكن أن تحدث لك الآثار الجانبية التالية مع هذا الدواء:

١٤. رمات فعل الحساسية

إذا أصبت بالحساسية كردة فعل توقف عن تناول شراب أسمالات واستشر طبيبك فوراً. علامات

رمات فعل الحساسية تتضمن: انتفاخ الوجه، المفتشين، الفم، اللسان، أو الخلق مما يمكن أن يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، ححات بلا هرش، الشعور بالتوغل والدوار والإيجار.

١٥. استشر إلى طبيبك باسرع وقت ممكن إذا:

- شعرت أن ضربات قلبك أسرع وأقوى من العادي (خفقان القلب بسرقة).

١٦. إذا ما هو غير موثق عادة، وتناول عموماً بعد فترة وجبرة من استعمال الدواء.

١٧. يمكن أن تشعر بدقة قليلة مقططة أو يغيب ضربة أضافية.

١٨. إذا حصل لك أي من هذه، استشر طبيبك باسرع ما يمكن. لا توقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة إلى طبيبك.

١٩. إذا حصل لك أي من الآثار الجانبية التي يمكن أن تحصل كذلك مع هذا الدواء:

١. شائم جداً

- الشعور بالرعشة/الإرتجاف

٢. شائم

- صداع/الم رأس

٣. شتنيجات عضلية.

٤. نادر جداً

- تغيرات في توازن الملح في جسمك.

٥. نادر

- مستوي مدين للبوتاسيوم في دمك.

٦. نادر

- زيادة في تدفق الدم في أطرافك (توسع محبطي).

٧. نادر جداً

- تغيرات في نمط النوم وتغيرات في السلوك، كالارق والإنفعال السريع.

٨. شد العضل.

٩. غير معروف

- ألم في الظهر، بسبب مشاكل في القلب مثل الربوحة الصدرية.

١٠. إذا كان لديك أي عوارض جانبية استشر طبيبك أو الصيدلي. يشمل ذلك أي عوارض جانبية غير واردة في هذه النشرة.

١١. ٥. كيفية تخزين شراب أسمالات

- حافظ هذه الدواء بعيداً عن نظر وتناول الأطفال.

١٢. لا تستعمل شراب أسمالات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على الغلاف الخارجي. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من هذا الشهر.

١٣. احفظه تحت درجة حرارة من ٥ درجة مئوية.

١٤. امسح عن الزجاجة بعد الاستعمال.

١٥. لا تستعمل شراب أسمالات إذا كان حذف توضيبه متضرراً.

١٦. لا ترمي بيدها أو أقرؤها عبر الياء الميتالية.

١٧. اسأل الصيدلي كيف ترمي بعيداً الأدوية التي لم تعد بحاجة لاستعمالها. تساعد هذه التدابير على حفظ العلبة وغیرها من المعلومات

١٨. ٦. محتويات العلبة وغیرها من المعلومات

ما الذي يحتوي شراب أسمالات على سلفات الساليوتاومول.

١٩. شراب أسمالات ٢ ملخ ٥ ملل من سلفات الساليوتاومول.

٢٠. الأخرى هي الماء، بروبيلين، غلوكوز، حمض الستريك، صوديوم السكري، سوربيتون، صوديوم بنزوات (تلعيم حامض البنزويك)، ونكهة الكرايميل.

٢١. شراب أسمالات خال من الكحول والسكر.

٢٢. كيف يدو شراب أسمالات على سلفات الساليوتاومول.

٢٣. يادي شراب أسمالات في زجاجة تهتز على الرياح.

٢٤. من: ٩٤٠١، الجديدة العتيق - لبنان

العنوان: pharmaline@mailagroup.com

رقم التسجيل لبنان: ٩٣/٢٤٥٥٦

إن هذا المنتج هو دواء

٢٥. إن الدوارة متينة يدور على صدحته ويمكن أن يشكّل خطراً عليك عند استعماله عكس التعليمات.

٢٦. يجب اتباع وصفة الطبيب وتغييره بشكل صارم ومتقدّم، وفقط، وذلك يبعض اتباع طريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي يعطيك الدوارة.

٢٧. لا يجوز فتح الدوارة المحددة من المقادير فقط.

٢٨. لا تقم بتكرار الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب.

٢٩. مجلس وزراء الصحة العرب يلزم بالدواء في شهر حزيران من العام ٢٠٢٣.